Metz & Comp. in Berlin

Linienstrusse 132 (nahe dem Granienburger Thore).

Besitzer der Steglitzer Samengärten, Versuchsfelder und Baumschulen.

II. Theil.

Gemufe: Samen.

Roblrabi über ber Erde .

Robirüben ober Stedrüben .

Radies und Rettig . . . .

Rüben und Wurgeln . . . .

3wiebeln und Borree . . . . .

Galat . . . . . . . . . . . .

Spinatforten . . . .

Preis-Verzeichniß

II. Theil.

# Gemüse und Blumen Sämereien

einem Auszug aus dem Pflanzen= und Banmschulen=Katalog.

Mult:

Geite

Stedawiebeln . . . . Ausbauernbe Ruchengewächse . . . Rartoffeln . . . . . . . . . Cucurbitaceen . Blumen, Biergrafer Gehölgfamen . . . . . . 20-21 Grasmifdungen für Rafenplage 21-22 Nachtrag, Die Reuheiten für bas Jahr 1868 und einige Gurfen, Delonen, Rurbis . . . 7-8 andere Samen enthaltenb . . 22-24

Musjug aus bem Pflangen: und Baumschulen:Ratalog . . 24-31 Dbftbaume ic., Beerenobft , Bierbaume und Straucher, Rofen, Georginen, Gladiolen, Belargonien, Pflangen jum Bepflangen von Gruppen, diverfe Rnollen ac. enthaltenb. Grasfamen für Garten . . . .

Bu gleicher Zeit wird ausgegeben:

- I. Theil. Verzeichniß über Sämereien 2c. für die Landwirthschaft und Forstwirthschaft.
- III. Theil. Bflangen= und Baumichulen-Bergeichnif mit praftischen Bemerkungen.

Ende Februar erscheint:

IV. Theil. Nachtrag zu unseren Katalogen über erft in biesem Frühjahr in den Handel kom= mende Neuheiten 2c.

Ende Ruli ericbeint:

V. Theil. Berzeichniß über Saatgetreibe und andere Herbstsamen, über Blumenzwiebeln 2c.

Die von uns gesammelten Berichte über Nutpflanzen, (Berlag: Biegandt & Bempel), 9. Jahrgang, ericheinen Ende Januar und find durch jede Buchhandlung , wie auch durch uns gu beziehen. Preis 18 Ggr.

#### Bemerfungen.

Die Preise gelten (bei baarer Zahlung) für frübzeitig eingehende Auftrage, für spätere kann eine Erhöhung, ober auch eine Ermäßigung eintreten; bei Abnabme von weniger als 25 Pfund ober 4 Megen treten die Pfundpreise ein, von weniger als 1/4 Pfund die Bothpreise. Emballage wird besonders berechnet.
Anstrage und Gelder erbitten franco. Den Bestellungen bitten wir, sofern nicht eine andere Vereinbarung vorangegangen, entweder den Betrag ober eine Anzahlung beizusigen und uns zu gestatten, den Archbetrag dem Gute nachzunehmen.
Um recht bentliche Angabe des Namens, des Wohnorts, der nachsten Vost- oder Gisenbahustation, wie der Art der Jusendung,

wird gang ergebenft gebeten.

# Fe Gemüse:Samen. Fr

Biese der hier angebotenen Sorten sind von uns selbst mit angemessener Sorgsalt gebaut, andere, für welche sich unser Boden nicht günstig zeigte, oder welche ersahrungsmäßig in bestimmten Gegenden ihre höchste Bollsommenheit ersangen, auß uns genau bekannten Quellen, über deren Sosidität uns die alljährlichen Resultate unserer Probeselber ersangen, bekannten Duellen, über deren Sosidität uns die alljährlichen Resultate unserer Probeselber

Sicherheit geben, bezogen.							
	Sgr		Pahlerbse, Mark-runglige.	Sgr	Phy		
Erbjen.	3	47	Britanniena Monidili	5			
Pahlerbse, frühe Mai., 3 Fuß h. 100 Pfd. 8½ Thr. frühe Wettrenner.	3		" 3% Suß hoch, febr fpat und fich lange fuß erhaltenb.	4	-		
" friihe Wettrenner-, " 100 Lft. 8 Thir. " Prince Albert, friiheste, 3 F.h. 100 Pft. 8 Thir.	3	.113	" Champion of England " 24 Buß hoch, mittelfruh, bis zu 10 Körnern in einer	1			
" Bishops, niedrige volltragende 1/2 F. hoch			Schote	-			
" " Stylops, meetige stately 100 Bfd. 8½ Thir.	3		Fairbaird's unvergleichliche, 3 Fuß hoch	5 6			
Daniel D'Rourke, allerfrüheste, sehr zu em-		104	" " Mammuth, niedrige grüne	6			
pfehlen, 4 g. h. 100 pp. 8 29tt.	3		" Veitch's Perfection	0			
d'Auvergne ou sernette	5	-310	Neu. Gang vorzügliche Erbje, sie verzweigt sich sebr ftark, besonders auf etwas ichwerem kräftigen Boben, und	-			
31/2 Buß boch; eigenthumlich gebogene, bis 8 Rörner baltenbe Schoten. Diefe Sorte gehort grade nicht gu		222	barf baber nicht zu eng gelegt werden, fie ift mittelfrüh und halt fich fehr lange wohlschmedenb.	13			
	1		Prince of Wales	7			
und burtte fich fur ben getobat int Groben ergient			Reu. 13 Bus bod, in freier Lage bedarf fie, geftütt burch robusten Buchs, feiner Reifer. Auch diese ift mittel-				
" " Emperor, belikat. Gine ber empfehlenswertheften, 28 guß hoch, 100 Bfb. 8 Thir.	3		burch robuften Buche, feiner Reifer. Auch biefe ift mittel- fruh und befigt biefelben Gigenichaften wie die vorige.				
Becks Gem oder Tom Thumb.	20		Commeliate Marrelarnien eldnen ilw all thich will				
Gine neue, mirtlich gang niedrige, nut ein punt			ipaten Aussaat. Sie find im Allgemeinen feiner als bie übrigen Gorten und werden besonders jum Gin-				
Bou hohe reichtragende Cible.	5	1 B	machan hannet.	Q			
" Burbridge's Eclipse, 1½ Fuß hoch	5		Budererbie, frühe große engl. Sabel-, 5 F. hoch	8			
"Harrison's Glory prolific, sehr friih	20		späte " " " 4 " "	8			
" Laxton's Prolific early long pod. Reu. Gine porgugliche reichtragende Sorte, mit jehr			vilmorins Knight Marrow.	10			
langen Schoten, welche gauftg 12 Rottlet treguter,	3)0	yaraf	Dieta mare im narigen Cahre in Den Dandel delbillitelle	92			
mittelfrüh, 4 Buk boch. Folgers, 3½ Kuß boch	4						
tràs nain de Bretagne	5		ben. Sie tragt ungernein reich und vereinigt alle Bor-	192			
" man 1 Ruf hach und non den Zwergerbien Die bouls	1300		niedrige, de Grace, 5 %. D. 3. Etelben	10			
tragendfte. Kann nicht genug empfohlen werben. " niedrige Burbaum-	4	n+0.	neite arone Mileiens, O Mile y	9			
" Schnabel-, große, sehr gut und ungemein	in m	perse	Rothelühend. Schoten über 4 3oll lang, wirklich riefig. In einer Berfammlung bes Gartenbauvereins, wo folde	100	1		
politrageno, 4 mil 1904	1	ine	anagelegt maren, erregten fie augemeines auffegen.	100			
" Honig-, vorzüglich, 4 Fuß hoch	5	6	frummichotige mit wachsgeto. Ochoten	5			
" Schwedische Mammuth=	7		" Spargel voer Flügel, 1 Fuß hoch Eignet fich ju Ginfaffungen.				
" Erbse des Ueberflusses. 4 guß boch, Schoten zahlreich und febr reichkörnig.	1		The state of the s				
Dickson's Favorite, all empleyen	4	100	Feld-Erbsen.	1			
Victoria inate groke engl. 5-6 kub god	4	-	Weiße Riesen=, 100 Bib. 5½ Thir.	2	(		
(Bold oder Wachs, ipateste, 5 gub 404)	4	2			H		
"Sehr zu empfehlende Bahlerbie. grunbleibende Caper-, altbewährte, vorzug-			tich gegen unguntitige Willetungbeinfulle weniger em	1			
"liche Sorte	0		pfindlich als andere gute Barietaten zeigt. Große frühe gelbe Klunker-, 100 Bfd. 6 Thir.	2	1		
Sutton's Ring leader Peas, 3 Kun hoch.	10		Cehr reichtragend und plattreto.	H			
Gine ala neu non (snoland aus employiene Cotte	,		Rleine frühe grüne. Preis pro Wijpel und	0			
bie aber noch kaum so gut als Daniel O'Rourke. "Marke, Alliance, weiße späte Zwerge,	5		Scheffel berauberlich	1 6	1		
2 Ruß boch, vom zweiten Blatte ab blugeno.	D P	9119	3m Kornerertrage wie im Geschmad gebort fie gu ben vorzüglichften. Ihrer außerorbentlich zeitigen Entwid-		-		
Marabias frithe 100 Rfd. 9 Eblr	3	6	lung wegen befallt fie felten.				
" "Peabody's späte Zwerg-, ¾—1 Ful hoch, wirklich spät, zu empsehlen	20	vin It	Große spate grune. Preis pro Bifpel und	9			
hoch, wirklich spät, zu empfensen	7	PHI .	Scheffel veränderlich	2	4		
Daburch, baf bie Schoten nur bicht gebrangt an be: Spige ber Bflange figen, befommt biefe Erbfe ein hochf			Es ift eine ebenfalls fehr empfehlenswerthe reich- tragende Kocherbie. Sie mächt üppiger als bie vorige	2			
eigenthumliches Unjehen.		1					
" " runglige, Knight's niedrige weiße, vor	5	5	Graue frangofische Winter-, 100 Bfd. 10 Thir Gie winterte im nördlichen Deutschland mehrfach aus	1			
3iiglich, ungemein reichtrag., 3 F. hod			mabrend aus milberen Gegenden Die Berichte gunftiger	C			
"" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1000			2			
	e	1	Gemahnliche inate gelbel Suill. Deluill.	FI A			
3 Kun bod wird, reichtragend tit und ich iunge imp gan		10 10	Der Areis der gewohntiden guten unbette einen Gund	-01 100	0		
Nonpareille, niedrige grüne, 3 F. hod	7 1 1 2	da litera	Erbien bei Abnahme größerer Quantitaten richtet fich nach bem Marftpreife.	ETig	1		
" " " hohe grüne, 5 Fuß hoch							

BOTA 39 163

Bohnen.	10 f Sgr	und   W	Buichbohnen.		fund Hg
Stangenbohnen, große, lange br. weiße Schwert	= 6		" Taubenaugen-, Salatreiferbohne von den	-	10
" Schlachtschwert, mit 12—14" langen Schoter			Alzoren. Neu	6	
fehr früh und volltragen "fleine weiße Zuder-Perle, ganz ohne Faser	1 7		" röthlich gelbe Strauchsalat-, aus Ja-	7	
" " " " Wachs=, neu	12		" gelbe Strauchsalat-, aus Schottland	6	
" große weiße dickhotige rheinische Zucker		Ter	" Blienburger, frühefte volltragende bunte		
" weiße von Soissons, zu empfehlen			100 Bfd. 8% Thir.	4	
" weiße Zuder= oder Butter=	. 6		Sie wird sowohl jum Treiben wie jum Anbau ir rauhen Gebirgsgegenden empfohlen.		
Die bewährteste zum Einmachen. Riesen=Zucker=Brech=, ertra schön	. 5		" frühe Parifer, runde gelbe, die allerfrühefte	4	02
" Riesen-Zuder-Brech- mit wachsgelben Hülse			worzuglich zum Trodenkochen. Dit Unrecht finden im Allgemeinen die farbigen Gor-		
und weißen Bohnen, gang extra	. 7	6	ten weniger Berwendung, obgleich die meisten berfelben sehr ergiebig sind und por den weißen Sorten sich durch	poli .	
" Römische Wachs-, gang ohne Fasern Meistens mit weißen Schalen. Wiberfieht ber Eroder	. 8		größere Biderftandefabigfeit gegen ungunftige Bitte- rungeverhaltniffe auszeichnen.		1
heit fehr gut.	Des		Buffbohnen, Erfurter gewöhnl. pr. 100 Pfd. 8 Re	3	
" große weißichalige Wachs von Algier Früher als die vorige und sehr volltragend. Sulfe			" Johnson's wundervolle englische	4	
lang und breit, febr fleischig; eine gang vorzüglich Brechbohne.	e	no.	" Windsor-, große breite 100 Pfd. 8 R.		
aus der Krim (Wolfsbohne)			"Monarch, mit sehr langen Schoten 100 Pfd. 8 R. "Mailänder, grüne	4 4	
Bachft fehr ftart und eignet fich, außer baß fie be Bitterungseinfluffen beffer als andere widersteht, fet			, de Navaoë	6	
reich trägt und ein wohlichmedendes Gemufe liefert, gu Befleidung von Lauben und anderer hoher Gegenftand	E IIIs		Burde zu hohen Preisen als perennirende Bohne aus- geboten. Die erwähnte Eigenschaft hat sie bei uns		
. neueste blauschotige Sped = (Phaseolu	S	177	zwar nicht gezeigt, dagegen verbient fie als fehr voll- tragende Sorte weitere Beachtung.		
Lucasianus) à Loth 2 Sgi		.0	Der friftefte Ropflahl von allen Und bes 1000	liai	III6
Mit schönen bunkelblauen Schoten und gelbliche Bohnen; eine außerft belikate und sehr ertragreich Sorte. Die Bluthen sind ebenfalls violet.	e		Feld Bohnen.	Hin!	
Sorte. Die Bluthen find ebenfalls violet.	. 5		Buschbohne, weiße Magdeburger 100 Pfd. 61/2 Re	3	
" " zweifarbige			Bferbebohne, gewöhnliche, Breis pro Bifpel		
" weiße	. 5	103	und Scheffel veränderlich		6
Lettere Sorten muffen ba Erfat bieten, wo ein rau beres Klima bas Gedeiben anderer Bohnen bindert.	11 2		" schottische,		
Buidbohnen, große lange breite weiße Schwert	,		Sat fich an mehreren Orten vor der unfrigen aus- gezeichnet.		
ertra	. 4	1	Linfen. Jenined reffern annt		100
" frühefte hollandische meiße Schwert=, gur Treiben besonders gern angewendet	4		Gewöhnliche weiße (nach bem Marktpreis) 100 Pfd.	1	1.5
" hochstandige, extra lange breite weiß	e				6
Schlachtschwerts		6	5eller=,	3	
" Haricot nain de Hongrie Gine unendlich reichtragende neue Sorte		0	Schwarze, 100 Pfd. 10 Å	4	1 .
Die Stauben sind ziemlich hoch, die Hulfen sind nu höchstens 2 Zoll lang und sehr körnerreich. Nicht zu al	tale .		Bohl.		Toth
ift biefe Bohne eine gute Brechbohne, fonft eignen fit bie Schoten, ihrer Rleinheit megen wie feine ander	ener d	22	- 0 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -		gr Ag
jum Ginmachen, die trodnen, nur widengroßen, rein	a		Blumenkohl, Asiatischer großer später 4 " Berliner früher, echt 7 1	5	5 .
weißen Bohnen sind gekocht ungemein zart. Kann nich genug empfohlen werden.	Dark!		Findet immer größere Unerfennung und eignet		
" Hundert für Eine			fich gleich vortrefflich jum Treiben wie für's freie Land.	18	-
" früheste Sechswochen-, neu	5		" Chprischer früher	il ii	5.
aroke feine weiße Buder= oder Butter=	. 5	SUR	Charles at an English to Carther		$\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix}$
, feine weiße Zucker-, Berl-, gang klein Gehr reichtragende Bobne burfte fich jum Anbau ii	. 5	- 127	" " Zwerg= neuer früher Treib= .		20 .
(Hyphon gigner	2000	100	Die starke Portion 10 Sg:	-	_
Flagevlet-, frühe rothe	. 4		" " guter nachgebauter	7	0
"Bilntot's gelbe frilhe Zwerg- Eine hellgelbe nierenförmige Bobne, welche wirklie jehr früh ift; fie trägt ungemein reich, fo daß die Stau	5		Der Erf. 3m.=Blumenfohl darf als die fconfte		
fehr früh ift; fie trägt ungemein reich, fo daß die Stau ben, wenn bas Laub abgefallen, nur aus Bobnenicote	nt		bis jest eristirende Sorte bezeichnet werden. Sein niedriger Buchs macht ihn nicht nur zum		1 6
den, wenn das Laub abgefallen, nur aus Bohnenschote zusammengesett erscheinen. Es ist eine sehr gute, wen nicht die beste Treibbohne; in England ist es die ge	n n		Treiben geeignet, sondern ift auch im freien Lande eine willtommene Eigenschaft.	U,	1
Imabieste zu diesem Zweite.	200		" Lenormand	1	5.
" Rafferlander, febr ergiebig und grun sowoh wie getrodnet zum Rochen ausgezeichnet	1 4		Vorzüglicher Blumenkohl, welcher mit Aus- schluß anderer Sorten in der Umgegend von		
" Frijoles, neue amerikanische	1 1000		Paris gebaut wird.	1	6.
" gelbschalige Wachs =, mit schwarzen Bohne	1 10		Stadtholder, großer fpater, febr gut. 5		6 .
oodstaudig	. 4	1	Dieser wie auch der assatziche find nach un- feren Erfahrungen in Bezug auf Boden und Bearbeitung genügfamer als andere Sorten.		
" weiße Nieren=, sehr ergiebig		(i)e	Bearbeitung genügsamer als andere Sorten.	HIJO	all the
		THE !	" Frankfurter Riefen= wird befonders	-	0
" rothliche Strauchsalat-, aus Ranada			fiir's freie Rond omnfahlon		
" rothliche Strauchfalat-, aus Ranada Recht hochstaudige, febr reichtragende Sorte. Zun Kochen vorzuglich.		10/10	für's freie Land empfohlen 4 1		5 .

				4		Ofur	id II	Loth	
Could 1	Pfu Th	sgr.	Cot!		Bohnen.	D)l.	Sgr.	Sgr	Pfg
Blumentohl. "Ralienifcher, größter "Derfelbe eniprach, wenigstens auf unserem Bersuchsfelbe, nicht ben ihm gewordenen Em-	201	· ·	55	- 10	Winters bis jum Berbrauch im Freien bleiben, er liefert aber, in einem luftigen Keller einge- schlagen, größere Ausbeute von Sproffen, weil lettere sich bier noch weiter ausbilden. Das Ausschneiben ber Bergrofe (boch nicht zu	idani	hS hS ioli		
Broccoli (Spargestohs), Elletson's Raiser=	2	gel	3		früh) befordert die Stidling det achten	1	25 5	1 1	6
" Italienischer weißer	1 1 2	20 25	2 2	6 6 6	"hoher frauser braumer "niedriger frauser grimer "braumer " feingefrauster Edinburger	0 9 0 9 14 ms	11 20 25	1 1 1	666
Ropftohl.  Berliner großer	3	15	4	6	Die niedrigen Gorten find mehr gu empfegien, weil fie fich unter bem Schnee besonders ichon	ens Hing	oise		
figen Wärften fatt ausschließlich angeboten. Braunschw. großer platter, extra I. Qualität	2	20	3	6	Blätterkohl, bunter Plimage- ober Feber- tohl, verschiedene Farben Balmen-	2 4	15 15	3 5	
" allerfrühfter Joanet, oder Nan- tais, niedriger weißer sester " Ensield Market, früher, vorzüglich	in on	25 25	1	6 6	Beide im herbste in Topfe zu jegen; jest beforativ.	10 . QU	12 16	1	
Filder, echter prizer weißer, wird bes fonders für hohe Lagen empsohlen Griechicher Eentners	3 3 3	15 15	4	6 6	grüner mit Blumenkohlblatt " gelber (Butterkohl) " Ein febr beachtenswerther Kobl, welcher im Freien ausbalt und bessen große gelbe herzblätter ein zartes, im Geschunad ben Wirsingtobl über-		25	1	
" Hittle Pixie	1	15	4		treffenbes Gemüse geben. Futterkohl, hoher blauer Riefens, 6— 7 Fuß hoch	21/3	15	2	
fpig. Der frubeite Robitot bon uten und finde faunten. Um Samenföpfe zu erhalten muß jpa- ter gefäet werden, da die frühen Pflangen häufig in demielben Sabre noch durchgeben.	MI C	trdo	deju	82	" Riefen- aus der Bendee " Engl. Kuhfohl (JerseyKale)	1 1 1	15	31	6
Ronig der Kopfronte, ein niediger spitzer, sehr zarter Weißtohl. Neu.	2 1 1	100	) 3	6	" großer, Tausendföpfiger	1	10	2	
" Niirnberger weißer großer später " Schweinfurter früher großer, echter " Strasburger gr. Ctr.e, spät, sehr gut " Ulmer großer Centner	6 3 3	100	4	6	einer Zeit, wo der Nangel odt an und under ift. Man saet den Samen im Nauz, verseh die Pflangen in fruchtbaren Boben und bedoch sie un herbit wie Spargelbeete mit kurzem Dun- fle im herbit wie Spargelbeete mit kurzem Dun-	t on	bob tra tribe	ini)	100
2Binnigstädter fruher gr. lpuger. Eine ber empfebtenswertheften Corten. Portscher früher spieger niedriger.	1	10	0 2	2 .	fürzt man im Spatietoli nete bie gelben mi Lopie (ober Kaiten) und umgiebt biefelben mi Laub ober Mit, um die jungen Blatter und Sproffen, welche wie Spargel u. f. w. bereite	t	hod So lari	John Committee of the C	re et
"blutrother großer später rundföpfiger.  jchwarzrother früher rundföpfiger  rother fleiner von Utrecht	64 64			6 6 .	Rohlrabi über ber Erde.	to the	15	dad in	3 (
" großer " " weißer feingerippter, aus dem Gouver		in in		2 6	" blatte " · ·	. 2		L 1857/	3
Eine späte, neu empfohlene Barietät, welch bei zeitiger Aussaat eine ungewöhnliche Größ	e	Dist.	on B		fie gern genommen. Frühe weiße feine engl. Glas				2
Wirfingtohl (Savoyer), Blumenthaler, gr gelbe fleiner allerfrühester traufer Joulin	1	1 1	9	2 .	Mittelfrühe weiße	villa di	. 14 7		2 2 1
Chou de Milan de Pontaise	t		-	3 .	Saater Riefen-Rohlrabi, blaue weiße		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	5
" Drumhead, engl. großer später "Marcellin, niebr. früher, vorzüglic	i)	1 2		2 (1 (3 ) 3	Rohlrüben ober Stedrüben.	200 01 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Dic.	1011	
neuer goldgelber Rürnberger, früher Kapuciner Ultmer, früher grüner	1000i		15		6 (Rohlrüben in ber Erbe, Autabaga, an Bruden genannt.) 311 Folge der wiederholten Mahrnehmung, d	aß	a in	17	2
Bictoria, neuer frauser englischer	0 1	1 1	10 15 20	2 2	on Lielen bie Kohlinden ju fen Gamen ichieße und bann guweilen in ben Gamen ichieße machen wir barauf aufmertsam, baf bie Aussa om besten erit Mitte April geschieht.	n, at		log.	-
Bucker-, friiher gelber	1. n=	. 1	25 10		6 Gelbe glatte gewöhnliche, 100 Pid. 28 Lt. Beiße " 100 " 28 "		. 1	0 0 2	1 1 1 1
artigen Sproffen in ben Blattwinkeln ein außer feines Gemufe liefern, kann zwar mabrend b	1.9111000	ph	级		Gelbe " " 100 " 34 "	THE STATE OF	. 1	2	1

Kohlrüben	D	Pfund L Sg		Foth Ph	Möhren Möhren	1 20	)fund Sgr	1 6 S
Berbefferte rothgrauhäutige gelbe Riefen- schottische Saat 100 Bfd. 28 Th	,	3 10	013	dl.	" lange rothe Braunschweiger,	29	Ogi	Sgr
Laing's beste gelbe, vorziigl. 100 Pfb. 28 Thi		10		1	100 9868 98 366	16	10	1
	de ph	10	) ]		" Dalblange agranting for		10	j
Feld-Rohlrüben.		130	gm	D B	" tolle Doll Sirren Jange Schare With		12	i
Engl. weißfleischige, schön, 100 Pfd. 29Thi		10	1		" rothe Horniche, sehr früh, lang		11	1
" grobe verbellerte, nell, 100 Rfd 28 Thi		10	511		" lange violette neue		15	1
weive violettopinge, Purple-top vellow	331	rual	the		Futter-Möhren.	Cola	Trans	rig"
Bu empfehlen. 100 Bfd. 26 Thl		9	1		Graha with " " and	131	HA!	
Oft-Lothian'sche violetföpfige, East Lothian.		100		lun.	Große weiße grünk. Niefen=, Siefige	L	102	
improved, 100 Bfd. 26 Thi		9	1	000	Saat, 100 Pfd. 15 Thi.		6	
Delve grunt, Green-top yellow		OF S	1	LED I	" " abgeriebene Saat,	Reli	pour l	
100 Pfd. 26 Thi.		9	1	No.	" prangegelbe (rothe) grünf. Riesens,		7	
Rarshall's violetföpf., Marshall's Pur-		1		10	100 Pfd. 28 Thi.	1116	10	UII
ple-top, 100 Bfd. 26 Thi.	9.	9	1		gelde Saaltelder (Darker) 100 98th 22 Thi	III.	10 8	
Bettere Corte lieferte auch bei uns die ihr	120	25	961	6	weiße ourchichtige friibe. Carotte trans-	1117	0	Die
Den Dieten Seiten nachgernhmten aubergroentlich	per	200		(8)	parente blanche	dell	16	1
hoben Erträge.		SHD	BEID	P.E.	yaiviange weiße Bogesische		12	1
Radies und Rettig.		1100	38H	03	" gelbe "		16	1
ohies frihammamis to me	G				Wurzeln.	rado	F 8	rat
adies, früherunde weiße furzlanb. Monats=	160	12	1		" Hafer=		25	1
" " rosenrothe "dorob, and	80.0	12	1		" Baltinat arnge runde herhofferte	OIL.	5	7117
n n gelbe n n nadi	2.03	12	1	30	" bon Jerfen, große Gine verbefferte Barietat, welche auf der Infel Berfen, wo die Kulfur der Anftinate auf einer boben Gute fiebt golden bet ber bei boben	130	6	
" " violette " "	15.	12 12	1	C.	Serien mo bie Buffertat, melde auf ber Infel			MI
" scharlachrothe		15	1	.	hoben Stufe fteht, gezüchtet ift.		P. A. A.	
" " " Biener, goldgelbe	Coin	15	1		" " Student-, eine lange glatte Rübe	- 0	other	
" rojenrothe, unteres Anollenende	4			e l	bildend, jehr ertragreich	50	714	1
meis. Neuheit	0.10	20	1	6	" Peterfilien, lange glatte	Fig.	71/2	n in
Eine febr icone Lafeldetoration; gang conftant. Auf den Martten von Baris faben wir fast aus-			-		" " turze dicte fifte	led	7	
nahmstos bieje Form.		dian			" Rapontica (Oenothera biennis)	mo	10	1
" ovale meiße, eine fehr frühe Gorte		20	1	6	" Mapungel (Campanula Rapungulus)	4	15	6
" " scharlachrothe	ring	15	1	0	" Scorzoner- oder Schwarzwurzel	107	25	1
" rojafarbene	mala	14	1		" Sellerie-, Erfurter großer befter Anoll-	1	20	2
" allerfrüheste halblange rothe zum	mac.	51118			" " holländischer großer Anoll	1	5	2
Treiben		20	1	6	" " Bleich= englischer	1	10	2
" lange weiße engl	adim:	12	1		3uder= feine	1	10	2
" rosenrothe engl	Value of	12	1	.	Rüben, Mais frühe runde weiße Soll.	1	0	
" violette	22130	12	1		" " " gelbe, feine Rübe		9	1 1
" neue von Madras mit egbaren Früchten	n 30	15	1	-	" allerfrühste flache gelbe Finn=		3	1
beste Sorten gemischt	79111	12	2		ländische, neue schöne Rübe	1	)-101	1
ttig, früher gelber Wiener Mai=		12	1		" " teine gelbe Malteser	1		1
, großer ichwarzer runder Sommer-			1		" rothföpfige sehr frühe Ameri-	plop	A goi	T
" rothichaltger Herbst-		12		6	tantiche, feine schöne Rübe	13	177	
" rojenrother chineficher Winter=		5	0		mit gelbem ungemein zartem	1		
großer sammarzer langer Winter=	Had	10	1		Fleische	3,11	12	1
" " runder	010	10	1		" " Schneeball-, weiße frühe		12	1
aus Java (Raphanus cauda-	ngq	15	tt		" Gerbst- lange weiße		10	1
unftatt der Rüben werden hiervon die Samen-					" " gelbe Bortfelder		10	1
gegeffen, welche eine Lange von 2 gut erret-					" " fl. weiße echte Teltower			1
ant, daß ihr überall ein Plätchen zu gönnen ift.	111940	2 4	1		" » von Freneuse			1
and the latest and th	110	Inje	O.E		" " schwarzschalige runde, delikat.			1 (
Rüben und Wurzeln.	91 8	100	0.		" " Boule d'or, sehr zart	. 4	- 1	1
hren ober Carotten.	140	10		1	Müben, Salat- (Beete), schwarzrothe			1
frühe furze rothe holländische	STITE VA	10	1	-	" " " runde Zuder	. ]	2	1
Jum Treiben mie fura freie Rand Die Mud-	11-15	[2]	1 .		" " bon Baffano, mit wei- gem, rothgeaderten Fleisch	-	9	1
" tui august liefert ein teined Mintergemine	08/01	E	2	1		1		1 .
time titrielte			1.	-	" Wangold (Beta brasiliensis) gold=	1	0	1 .
Gine dunfelrothe nach unten abgerundete (Sa-	1	5	1.		rippige. — Carmoifinrippige. — Sil-			
	dis.	年		1	ber= oder weißrippige. — Scharlach=	0		
Douwiker, furse Treths	1	2	1 .	1	TUDDIGE. Sepre Sorte a lith 1 Sar			
Brone luke Alternanam, nene her-	me la	10 mg		-	Die Blattrippen liefern ein außerft feines Gemiffe. In Frankreich wird faft nur die weiß-	1120	1 27	- 20
befferte Englische Saat	11	2	1 .	1	rippige Bar. benugt. (Poirée à cardes blanches.)	111111111111111111111111111111111111111		1

				(	6		100		Pfur	
	pfun	d I	Sgr		14	Dium Sate	The	Sgr	Sgr	1
2 2 2 6		20	1	-10	5	Oberdorfer gelbe, echt (Bayer. Rangeres)	20	9159	6	6
Rerbelriibe, Chaerophyllum bulbosum.	18	30	1			hier nachaebaute	16		15	.0
Erot vielietiget Gint Coming nach immer nicht	10 3	You de			2	Bentewiter Bon Leutewiß birect bezogen.	11	10 00	1	13
Die ihr gebuhtente in in incht übermäßig	g \$0	ina i		,	9	W	24		9	
funden. Gie gebeiht in feben nem Binter ge- ichweren Boben, muß aber por bem Winter ge-	130	jer				Gine allgemein zu den beften aller runden Formen gegählte Sorte.	10.0	ia ui	llon	(6)
fcweren Boben, mus gorg frifder Samen keimt, fact werden. Da nur gang frifder Samen keimt, jo werden wir und zugehende Aufträge im herbst	1 1	HO			. 0	Gelbe Biener Teller=	17	100	6	
want priphiden.	-			1	5	Rothe Wiener Teller=	17	ois	6	(3)
Rerbelrübe, fibirifde, Chaerophyllum	3		4			b) halblange Formen.	of date	time.		
Berdient ber gewöhnlichen barum vorgezogen	DI	1 9		9	1	Charles Richen-Flaschetts	13		5	
an werden, well he now gettig int orwand					B (	Chatha distant - blottenett	13	. 171	5	1155
faet werden tann.					1 6	Makita districts ache	15		6	
Rüben jum Anban im Großen	1810					Nene Ritelen-Atant, tottle	1 8	Un	dim	ACC.
auf bem Felde:	20.5			lan.	1	e) lange Formen.	10	40	5	- 70
				BOIL		Matha aus der Gride machiende   Gionen fich	13		P	
Englische Futterrüben, engl. Feld-Turnips. White globe, weiße Rugel-,	te		Hi.			as ve and Carda machiende am betten	Te			9
100 20 20.	loui.	9	011	Log		Beiße aus der Erde wachsende sum Blatter Lange rothe halb aus der Erde wachsende	1:		5	
Woolton's hybrid red globe, Mool-			-	1		Lange rothe hatb aus bet Cest is any	2 01	n/C		
tours subvide rathe Mildels. Dulyngham		8	174			Buder - Runkeln.	by	min.	atio	bila
Skirving's improved purple-top, Stirving's	×3	)at	1		The same	Echte weiße (zur Zuderfabrikation)		7 .	- 1	3 .
verbesserte Bullock, 100 Pf. 29 Thi.	m.	10	1	8		Echte weiße Imperial= "		7 1		3 .
Cehr halthar.		d oni	1	T.		Vilmorin's neue	. 2	о .	. 11	2   •
Green-top yellow Bullock, grüntöpfige gelbe		10		1	. 1		1	ofuni	11 €	oth
9511 1DCL. 100 DD. 25 296	MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	10				Zwiebeln und Porvee.	20		gt S	gr Hg
Purple-top yellow Bullock, violetföpfige gelbe Bullock, 100 Pfd. 29 Thl.		10	)	1		Zwiebeln, blaßrothe Erfurter	orte	1	71/2	1 .
Dolo's hybrid grinfoptiae gelbe Dale's	mill	mi	217	4	1		je j	UI O	21/10	1 0
huhring Mildels. 100 DD. 00 24.		11		1		" nouanorja	()			$\begin{array}{c c}1&6\\1&6\end{array}$
White Pomeranian Globe, weiße Pom- mersche Augel-, 100 Pfd. 26 Thl.	THE REAL PROPERTY.		9	1		" gelbe plattrunde hollandische	-1015			1 6
White Green-top Tankard, weiße grünf.	HO.	3030	3	-	1	" lange gelbe birnförmige	BT OI		20	2 6
Prings. 100 Dib. 20 291.	1		9	1	-	Watta Stroight	SECULIAR S	1 1	2½	2 6
Vallow Tankard gelbe Rrug=, 100 , 25 ,			9	1			er	rici	Bo	
White Red-top Tankard, weiße rothf. Rrug- 100 Ffb. 25 Thl.	1.	9	9	1		wenig haltbar. Dan muß fie ins Miftbeet fo und auspflanzen, da fie eine langere Begetation	18=	dist	3	
White Norfolk, weiße Norfolfer	lage.	3	9			Beit beaufpruchen. " von Nocera, sehr friihe feine weiße		2	25	4 .
100 \$10. 20 241.	lai	.0	9	1	C.	jowefelgelbe hollandische, beste			25	1 6
Tweeddale improved, gelbe violettöpfige,		1		1		filhormotice		1	5	2 .
100 \$15. 30 27	illb.	1	.1	1		St Comes	1 E		10 25	1
White-Green-top Globe, weiße grüntöpf. Rugel, 100 Pfb. 20 Thi.		7	9	1		" Binter=Becke=		30.3	770	tinH
White Autumn Stubble 100 " 20 "	0	9	9	1		Stedzwiebeln fiebe Seite 8. Boree, größter Brabanter			25	1
Waite's Eclipse Purple-top yeardw.	,	1	10			frangofischer dider Sommets	nge	a bit	17½	1
100 plb. 21 291			10	•		Sictor Minters	*15/11	UIII	20.	1
Neue, von England aus als bet gant all gepriefene Sybribe. Sie zeigte sich bei uns al-	3					" von Rouen oder monströser fur bicker, sehr großer.	act	1	5	2
gelbsteischige ich nartrefflich und wir	6					von Poitou, großer gelber	orie	1	5	2
		dr	13			Vest A most Of		30	tur	
Dieh dem aller anderen Sorten vorgezogen werde Herbstrüben, lange weiße rothk. Ader Herbstrüben, Tange weiße Rothk. 18 Th		a				Salat.		196 11	nita	
			8	1		(w bedeutet weißer, s schwarzer Samen.)	100 8	pdata	00	men
munho motte rathe viller Duc	L I	-	0	4	-	Controlat Stelliddis, this getter		1	20	1
			9	1	-	_ Didinici .	1 11	100	98	-
" lange weiße grünk. Stoppel (Mürnb.), 100 Pfd. 24 Th	2	ne	9	1	36	" Beibe zum Treiben. " Asiatischer, großer gelber w		ofto	25	1
(Muthb.), 100 Ph. 2129		1	t l	-	1	Chring groker gelber W		HITT S	25	
uon Mariano, mit mei-						OB antisone arotter deliger S		1113	25	1
Runkelrüben.						Porzuglich feit und haltbar.			25	1
Futterrunkeln.						Forellen=, bunter w	911	II.	25	1
must be of the	41	00 10		106	nnd	Manufactor Collers W		1	15	1
Gewicht p. Mge. ca. 2 Pfb.		PT 8			Ph	In der Eigenschaft, selbst in den geißeiter	Ponte	W	ond	
a) runde Lormen.		2	ville	5		trodenten Sagren fonte und gerte unferes	Wij-	1 3	030	1
Gelbe Klumpers	. 1		15	5		Par Beiner anderen erreicht.	(EII)	Hat's	150	
Mothe Ministra	- 11									

Salat.	20	Ofund L   Sg	. 8	Foth T	Gurfen.	277	lfund   Sgr		So gr
" größter Schweizer, fehr gut w	T Fla	1 .		1 (		THE	VISION IN	2	
" hochgelber Eier= w	100	2	5	1 6	" weiße Schlangen=	6			7
" Bruine geel, frühester w	dori	2.		1 6	" früheste ruffische echte, zum Gin-				
Ein gang vorzüglicher Salat mit febr großen festen Röpfen und recht dauerhaft.	1	- 0			Diefe frube und ungewöhnlich volltragende		51.00	1	1
		11/190	1000	1013	Surfe batten mir jeit einer Reihe von Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden und Witterungsverhaltnissen, unter benem andere Sorten nur mangehafte Reinletz lie		einle	7	
" Prinzenkopf-, gelber w	die.	2!		1 6	mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter			4	
" blaßgelber Dresdener, zu empfehlen w " aus Algier, Treib=		2		1 6			naso		
" Chou de Naples friiher w	lac	1 10		2 .	i cricii.		DEED		
" Schwedenkopf=, röthlicher	1	1 10 25	2	1 6	Gurken, immertragende (semperfructi- fera), echt. 25 Korn 2 Sgr.	HF	1	0.00	
" Barifer Zuder-, fehr groß u. zart	1			1 6	" furze frühe Trauben	-	1 -	25	)
" Wontree, jehr früher w		25		1 6	" sange grine Patrix (bis 25 Zoll sang)	1	5		5
" beste Sorten gemischt		25		1 6	25 Rorn 2 Sar			-25	
2Binter=, brauner		. 25			" blaggrine brailtanische zum Treihen		Jim	170	1
Schnitt= oder Stechfalat, frauser gelber.		15		1.	25 Rorn 2 Sar	TI.	onis	25	,
Adersalat, Rabinschen, am Rhein Maus-	1	ahad	101	I DECE	" " "urnstadter Riesen = , arine, ausge-		2		
ohren gen., (Valerianella olitoria)	21.9	15			geichnet. 25 Korn 24 Gar	336	2 3	35	0
" Hollándischer, großer	100	20		6	" griine Chinefifche Schlangen : . Beibe gehören ju ben portrefflichften Gurten,	8	1007	10	9
" Stalienischer, extra Diese Sorten muffen ftets im Septbr. gefaet	1	5	2	0					
iberben.	212.11	miled	1	I CO	find weniger empfindlich gegen ungunftige Witte- rungeeinfuffe und befallen nicht leicht.			ring	
Endivien, große weiße Batavier	1	digu	1	6	" Gladiator, zum Treiben 25 Korn 2 Sgr.	1		25	
" gelbe frause Winter=		Hare to			" allergrößte Treib=, non plus ultra			20	
" neue moosartige, feinste	.1.	. 15			25 Korn 2 Sor.	-	9111	20	
" selbstichließende Casseler Sommer	1		2		" Roman emperor, Treib=, porzijolich	8	circul.	10	
Die Endivien bieten eine angenehme Aus- hilfe, wenn der Winter dem Gebrauch der	alle		cine		" Sion House, schöne Treib = Gurfe		HOL		1
Ropffalate ein Biel fest. Man binde die flach auf der Erde liegenden Blatter nach erlangter		-	0		maxanan m. 25 Korn 2½ Sgr.			30	1
		en.	20		Melonen, Mai - Ananas -, vorziiglich -				1
Bei eintretandem Traff und gart	1500	.1153	h@i	PE					1
gusammen, wodurch die inneren bleich und gart werden. Bei eintretendem Froft werden bie Pflangen berausgehoben und im Keller einge- ichteen ober einebentetenten	tem	(A)		(1:2)					
		100000	MIN NO	100	Bariser Gloden -, für's freie Land,		i :	de	ľ
resse, grüne gewöhnliche " extra kranse (Plümage)	5.0	5	2011	6	Buder- von Lours — Minstat= — Pres-	700	1	Crime	l
" Judian. oder Kapuzin. (Tropaeolum	lien;	6	10.00	6	cott-Cantalupe aus Bervianan — Mone		tunt	Tion	
maina	( 21	15	154	100	Ameritanische für's freie Land - pou	E	9700	beg	9
" neue griine amerifanische	i	10	神	G	Donnleur - White Japan - non Ennern	17 11	ron	aja	P
ZI Commenter to	See		DIII S	10	- Stellmann's feine Netz weiße	ittro	0 0	Hild	
Spinat-Sorten.		etni)	otu	offi	Bour portehan Malayantantan Sia Want 21/66	25	iten	ter	
The same of the sa	2211	II. In	TE GE	130	Bonvorstehend. Melonensorten die Port. 21/2 1/29 1 Sortiment von 12 Sorten 221/2 Sgr.	2 3	1		
Bleich nugbar als Winter-S., wie für ben		4		6	Melonen in sehr guten Sorten melirt	11 0	3170	10	
	SYC				a jeye gater Octeti mente	·IUG	CHO D.	1.2	1
" gelber salatblättriger		6		6	Rürbis.		200	- 10	
" Lee's neuester Riefen= fon 6-8 guß	20.0	M- 11	a inii	6.00	1 9 at 1 1 mmonne muoisart	mor	ul fu	office.	
pour wetven. Deiginal-Portion 15 Ggr.	mne			ab	a. Speise-Kürbis.		male		
" Neuseeländer (Tetragonia expansa)		15	1		Engl. Schmeer= (Vegetable marrow)	1 8	50	2	6
Diefer fehr wohlschmedende, bie allgemeinfte Ammendung verdienende Spinat bietet in ber					Oroger Keld=	4000	15	1	
peigen Jagreszeit, mo der gewohnliche G. faum	ar.		10.	5	Großer weißer Centner=	HOT	Control Park	10	2
Aushilfe Die porber einzemeichten Corne	7 7			6	" rother " gelber "	STO AL		8	
merben auf nahrhaftem Boden in 1 &B. Ent-	mi	TIL		5	" gelber " " von Balparaiso	10		8	
fernung geftedt und feucht gehalten. Man ichneidet gewöhnlich nur bie Blatter, die fich	nith	Helf	101-	(6)	" Melonen=, Centuer, echter, Port. 4 Sg	W.		20	
immerfort erganzen.	100	Holl	110	10	Neapolitanischer oder Porte - Manteau		. 1	U	
. ausdauernder (Phytolacca esculenta)	3	0.	4		(Mantelfact) Portion 2 Sor	9	divid	2	100
Die rothen Beeren werben vielfach jum Far- ben von Fluffigfeiten zc. benubt.	131	au	èihi	3	Ill als Sheifefurhis hintichtlich has die	) 111	212		
englischer perenn. (Rumex Patientia)	0 1 1	15	1		ichmades allen andern Sorten vorzugieben.	HOT O	Direct	18	
Gebrempfehlenswerth als angenehmes Gemife.	34	HILI			b. Zier-Kürbis.	11	115	01	
vernantiger (Chenopodium Quinoa)	Sec. 75	10	1		Rachftehende Carten haben meift aufanges aufrig	39	do 9	tupi	
werampfer, großblättr. Garten=	014	15	1		Rierende Fruchte. Die mit & bezeichneten eignen	1	bon	1003	
Straut (Mesembryanthemum crystalli-	000	HO I	0		1. § Angurien 9. 8Coloquinte aufelform		19	dlac	
(mun lumpe - same amm)	.310	000	3		2. Apfelfinens, großer 10. & birnform	15 (2)	mpre		
Gurfen und Melonen.	VIE	ARAMA S	MIA	20	3. fleiner echter 11. Colinbers, goldgelber 4. Alabafters, weißer 12. & Cichels, fleiner	1	3 159	Hos	
and the state of t	0	iat.	9	0	5. 3Birn=, zweifarbiger 13. Flaschen-	101	101	-	
	2		3	in	6. , fleinfter gruner 14. Reulenförmiger aller-	1010	191	7	
	4	101	5	-	7. Bifchofsmuse, bunte 15. § Rugel-, weißer 8. Chinefermuge, 16. § hochrother	THE P	10	HI Z	
	C.E.		U		o. w.pinetermuse 16 8 hadvathar	-90	- H W	and the last	

				5	
Charles and H. S.	Pfu		Cot Sgr.		Pation Section St. Sec
17. Straußei, weißes 20. Walbhornförmiger 18. Türkenbund, rother ge- 21. Zwiebel-, fleiner dunsteller 19. § Vajen-, echter 22. Stackelbeer-, aller-		ii.	Offe	-	Senf, gelber       . 3       . 6         Spargel, bester Riesens       . 20       1 6         Thymian, deutscher Winters       1 20       2         " französischer Sommers       1 25       2         6       1 25       2         6       1 25       2
Sede Sorte à Br. 2 Sgr. Reinfrüchtige Sorten gemischt à Br. 1 Sgr. Großfrüchtige Sorten gemischt à Br. 1 Sgr. Die anderen Zierkürbisse siehe "Cucurditaceen" Seite 9.	ofini intui intui inter ofini vitos	defe Te b uni en- u	5 4		Rermuth
Küchenkräuter 20.	11111	,111			Schreebentagt, röthilder sigelmdegibe
Artischoden, große grüne	135	6	3	6	pflanzen, Steckswiebeln etc.
" violette französische Basilikum, großer grüner	1 1	10 10	2 2	6	Steckzwiebeln. 100 st. 5.
" violetter Bohnen= oder Pfefferkraut, Kölle Borretsch	2	12 12	3 1 1 1		Winter-Hede
Cardi, spanische Die gebleichten Stengel und Blattrippen wer- ben wie Spargel oder Salat zubereitet.	675 677 757	20	1		beren Sorten eine wichtige ausguife. 100 St. 7 Schalotten, gewöhnliche . 100 n 12½
Coriander Dill Gierfrucht, Solanum melongena, weiße und	ota	57		6	Preis unbestimmt. Bergendbar b. Juli die anguit. 6 Rodambolzwiebeln
violette Bortion 1 Sgr. Mesembrianthemum crystallinum Esdragon (Artemisia Dracunculns) Pflanzen	H	non	4 3		Conittlauch 100 , 10 % 15 Rartoffelzwiebeln, gelbe beite 100 , 15 Geiner als alle übrigen Zwiebeln und febr zu empfehlen.
12 St. 18 Sgr. à St. 2 Sgr. Giebt bier keinen keimfähigen Samen.	see.	110			Nuchauernde Küchengewächse. Di. St.
Fenchel, süßer Bologneser	8. 35 bet	125		6	Artischen, überwinterte Bstanzen. 20 2 Sitrenen-Melisse (Melissa officinalis). 7½ 1 Estragen (Artemisia Dracunculus). 18 2 Siop (Hysopus officinalis). 6 1
Rerbel, frauser Lavendel oder Spike Löffelkraut	d in	16	3	6	Ryangement vo. Spife (Lavendula Spica) 6 1  Ravendul vo. Spife (Lavendula Spica)
Liebesapfel, Tomate, Solanum lycopersicum Majoran, franz. Stauden=	1	22	1/2 0]		Steffermunge (Mentia piperia) 71/2 1 Salbei (Salvia officinalis) 15 2 Spinat, englischer (Rumex patientia) 71/4 1
Melisse, Citronens Betersitiens-Burzel, lange glatte " kurze, dicke, sisse.	g.61	o lo	7 100.	0	Raute (Rata graveolens) 6 1 Rhabarber (starte Pflangen) 9136 100 Stud 15 Sar
" extra frause Pflück»	1 31	71	6	(	WY . Y. D. Wanness trans Charmichan
" Myati's zierende Pfeffer, span., Capsicum annuum Bimpinelle		1 13	3   3	2 .	Unjere Brobefelber jeben und in ben Stand, im Brubjahre gur Pflanggeit von faft allen Gemufen Pflangen gu ben mäßiglieren Preisen abgeben zu fonnen, und bitten wir nur um rechtzeitige Beftellung.
Portulad, gelber		2:	5	1 (	Meht
Borree, größter Brabanter frangösischer, dider Sommer=		25 17 20	1/2	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	Gürstenwalder, frühe rothe
" dicer Winter=	r	1	5	2	Gelbfleischige Zwiebel- fachfische.
"von Poiton, großer gelber Rhabarber, Bictoria	r	1 .	5	5	Grüne oder Seiligenstädter 4 Sechswochen-, lange weiße 6 Bekant als die früheste unter allen Kartoffeln.
Raute oder Weinraute		ni al	3, 115	100	2Badistartoffel Dieje Gorte wurde von dem Gartenbauverein in den Kgl. Breuß, Staaten empfohlen. Sie gehört ju ben feinsten,
SalbeiSauerampfer großblättriger	8010	$\begin{array}{c c} 1 \\ 1 \\ 2 \end{array}$	5		weißen Speisekartoffeln.  Reinwochens, friihe runde
" holländischer großer Anolls " Bleichs, englischer " Cole's Aristalls	da ii	1 1	0	2 2 2	Circassienne , , ,
Senf, brauner hollandischer	.	THE OTHER	5	10	6   Cebr feine Speifekartoffel. 3 anning anna natig

Braunfdiweiger Zuder-, frühe runde ... Chardon-, spate runde ..... 9 Rohan. 6 Blaumarmorirte, früh, fehr gut..... 6 10 Von Vigny, frühe lange ...... 9 , runde 9

Anger vorstehenden Sorten führen wir noch eine große Bahl anderer, vielfach empfohlener, darunter auch die Paterfon'ichen Züchtungen, und offeriren hiervon: Gin Sortiment bon 25 Sorten ..... 2 Thir. Rartoffelfamen, von ben besten Gorten gefammelt pro Pfd. 2 Thir. pro Lth. 2% Sgr.

Soth

20

10

Port. Th

4

2

2

1 6

1

2

Sgr Dig

Cucurbitaceen.

		0	100	TE V	72000000116
	Sgr	oth Hg	Do	rt. Pfg	Togonomic S
Benincasa cerifera, Wachstürbis, in- teressant Bryanopsis laciniosa erythrocarpa Mit steinen roth und weiß marmorirten Frückten, sehr schön.	10 15	1809	2 2	6	" angolensis 10 Rorn 7½ Sgr. enormis
" Mac Kinni, neu 10 Porn 4 Sor	12		2	18.	" sphaerica, Kanonenkugel = 10 Korn Reu und großfrüchtig. 4 Sar.
divornifolia 40 0	10		2	8 90 80	Luffa acutangula  "Jacquini 10 Rorn 2½ ©gr.  Melothria cucumerina  nendula
" ficifolius	12	1900 1900 1900 1900 1900	2 7 2	6 6	" pendula 10 Korn 2½ Sgr. " Regeli, nen 10 Korn 5 Sgr. " scabra 10 Korn 5 Sgr. Momordica Balsamina, Baljam-Apjel
10 Rorn 5 Sgr. 25 Rorn 10 Sgr.	Anon Ala	00	2	0	" Charantia. " elateria, Spitzgurke Sehr intereffante Kruckt.
Angenehme Deffert Frucht.  "digitata 10 Korn 3 Sgr. Reitende neue Sneckes mit ichnan 2003.	oa z oa z oraz	muli valto	A.	00000	Pilogyne lucida 10 Korn 4 Sgr. Neu. Mit scharladrothen Früchten. Sechium edule (Chayotte)  Mit großen 1—2 Pfb. ichmeren ehfaren Früch-
Gridden.  Cyclanthera explodens	DLA mp	SH7	5	9	ten; jegr ichneuwuchig und intereffant.
	7	Tis?	1		Trichosanthes Anguinea, Schlangen- 10 Korn 5 Sgr. " coccinea 10 Korn 2½ Sqr.
Lagenaria longissima, Flaschenkiirbis	5	eev!	1	6	Ebenjo interessant in ber Form wie die übrigen Barietäten, doch schön roth gefärbt. " colubrina, Natterns
" depressa gedrücker Flaschen=	5		1	6	" palmata 10 Korn 5 Sgr.

# 06

halbe Prifen, halbe Sortimente sowie Loththeile unter 1 Sgr. Werth, werden nicht abgegeben.

Erflärung ber in nachfolgender Abtheilung angewendeten Beiden.

OF. Commergemachje bes freien ganbes, welche gleich an ben be-

ftimmten Orten gefaet werben. welche gut Crzielung eines zeitigeren Flore in Miftbeete, ober Löpfe gefaet und bann ins Land gepflangt werben fönnen. OT. Ginjährige Topfgemächfe.

welche im Mai mit Ballen ins freie Land verfest werden

fönnen. 4F. Stauden des freien Landes (Pflangen mit alljährlich abfterben-

bem frautartigen Stengel und ausbauernber Wurgel). A. Pflangen von nur 2. (bis 4.) jabriger Dauer. Aussaat ins

Miftbeet ober in Topfe. 4 T. Topf-Stauden.

T. Lovi-Stauben. Die hingufügung von F. bebeutet, baß Copigewächje mit aus- | fie fich gum Ansbellangen ins freie Land nahrend des Sommers eignen, O daß fie bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre bluben. bauerndem Stamm.

w. Topfgemachfe, melde ber Barme bedürfen. §. Schling- und Rletterpflangen.

Blangen, welche fich gu Ginfaffungen eignen. Gir Pfangen, bei benen feine ber obigen Beiden ffeben, gelten die vorhergehenden.

#### Neuheiten fiehe im Rachtrag.

		Sortimente.	err	
	8	Intelle afterfise Aftern. Thousand algeliup.	UPI	
1 2	Ein	Sortim. Neuefte Biftoria-Aftern in 11 Farb. à 100 Korn	35	
3	77	" Webels Doer Mobre 21 thern 14 3 100	10	
4	25	" Rugel-Aftern, ertra gefüllt . " 13 " à 100 "	9	
-	77	" Chryfanthemumbluthige groß- "	1	
5		blumige 3merg-Aftern , 11 , à 100 ,	12%	
6	7	" Swerg-Altern	10	
0	29	" Zwerg - Bouquet-Pyramiden-	126	
7		Aftern , 10 , à 100 ,	12	
•	29	" Franzolijche paeonienblutbige	TE	
		" Französische paeonienblüthige " 16 " à 100 "	20	1

Mar	100	as is boben vicilitars &O.TP. Soone Guentbilacee mit
9 10	2 7	Fortiment Cruffant's Imbrique- Pompon-Aftern
11	7	(Bolhe) 6 , à 100 , 74
		ben-Aftern , 6 , à 100 , 74
		Levkohen.
12 13	Ein	Sortim. Engl. Sommer-Levedy. in 18 Farb. à 100 Korn 174/2 , Reue großblum. Sommer-
14	n	Berfoyen

	10eoth Br.											
orland Ma		Sgc	3800	Sgr Sgr								
Na		leger, tribe runber	70	Acacia pulchella, nieblide A								
15	Ein	Sortiment Reue Zwerg-Bord. in 8 Farben à 100 Korn 15	71	Acacia pulenein, fiertunge M. verticillata, quiriformige M. " Cammtlich icon, in ben verichiebenften Ruancen								
16	77	Gwal Cammers leptopen mit	P	bon gelb blideno.								
17	77	Ladblatt , 12 , à 100 , 123, 2 mmerblühende Sommet - , 7 , à 100 , 10	72 73									
18	. 7	Rene großblumige Phramis		blau								
19	0	Dens Bouquet Commer Leb. , 4 , à 100 , 6	75	, illinitum								
20 21	79	Frühblüßende engl. Serbit-L. " 6 " a 100 " 15 " Serbit- vder Baftard-Levkoven " 8 " à 100 " 15	76	uncinatum, dunteibila								
22	מ	Rinter-Levtopen	the land	1 Fus hohe, ichone Jumberteden. 2.F. 288, hellblau . 2								
23	77	Bitter-Levkopen , 3 , à 100 , 6 Briter-Levkopen , 8 , à 100 , 15	79 80	Adenophora suaveolens, wohlten. 41. Reizende Retterpflanze								
24	79	, " Großblum. Rutter-Centryen.	100	mit gablreichen, rojafarbenen Stutgen. OF. roth 21/2 1								
		Continue of Tr.	82	Aganatum mexicanum. OFT. 1-1% Sug, himmelblau 5 1								
25 26	Ein	n Sortiment gefüllter Stangen Lad in 3 Farb. à 100 Korn 7 10 , Bufch Lad , 5 , à 100 ,	84	, nanum, niedrig								
20	-	Baljaminen ausiner	85 86	" " alolliotali, " bimmeldrodchen. * FT.								
0.77	Orio	25 Rorn 6		Agrostemma coen rosa, gimintete de la 11/18. h. Lebbaft roja								
27 28		" " Gamellien Ballaminen (Andrieux) 8 25 3 25	88									
29 30		" " Rojen-Valjaminen (Andrieux) " 4 25 "	89 90	" atrorosea, tiefroja								
	13.	elothria, cucumerina	91	" purpurea, purpurtoto								
31	Ei		75	burch icone Garben, reiches Blugen und com								
32			. 8 94									
33	. 8	" " Gridterminden (Ipomoea	10									
35	1	purpurea) OF , , a 1 por	5 93									
36	5	thouse adorates (+) F	5 94	6 mm of hanger South 2 F. 2 WB.								
37	7	" " Bunderblumen (Mirabilis Jalappa) 20 TF , 10 , à 1 ,	7½ 95 96									
38	В	, , Flammenblumen (Phlox	5 97 7% 98	Warscewiczii. 12 88. 9. Leadytein Rrachtvil. 24 TF. 2								
39		" Gefüllter Keber-Mohn Or. , 10 , a 1 ,	7½ 99 7½ 99	Althaea rosea n. pl., genute kinne unferem vorzug-								
40		" Gefülltes Greusfrant (Senecio elegans fl. pl.) GFT	7	ilden Strint. engerigmenlung best Gartenbaubers								
4	2	" Helichrysum monstrosum 5 , à 1 ,	7	eins allgemeine Bewunderung ettegte.								
	3	Portulac OFT , 5 , à 1 ,	5	Diefolken comitcht								
	4	" gefüllter Portulac, Bottmut. 4 , à 50 Rorn	7½ 10 17½ 10	1 Alyssum Benthamil, Orice Meichblübend, 2 F 2								
	5 9	" " Tropseolum nanum (Tom	10	3 , Wierzbeckii, Butcherich 1919								
		Zinnia elegans OTF , 5 , a 1 ,	7½ 5 10	4 Amarantus bicolor, zweifarbig 11. 12 0p. 4 4 1								
4	17	fl. pl., getullt blunenge , + , " - "	7½ 10 10 10	melancholicus ruber. Bett butbutstunden.								
	19 50	", Biergrafer "12 Sort. a 1 " 25 " 1 "	20	OTF mour Swifarhia Ranageienfeder, Mit								
- 9	51	Round	7½ 10									
	52	" " Commerblumen für's freie Land a 1 "	15 10	08 Amaryllis Tettaui, (Hippeastrum robustum)								
	53	" " Commerblumen fur's freie		09 Ammobium alatum, 4 0 1 F. bellevite Salatorication of the salat								
	54	Commerblumen fur's freie	60 1	11 coccinea, idantidutty								
	55	" " Commerbl. jur Ginfanung " 12 onto. a 1 "	12 1	13 " cupreata, fupterrothe. Heu bellblau und lila								
	56 57	, Schönblübende und becorative ausbauernde Standen . , 12 , à 1 ,	12	2-2 88. 0. Oilian Quinklume 21 F. 2 88.								
	58	Topfgewächse fur's Warnt	30 1									
	59	Tanfacmanie tur's Kalinaus , 12 ,	25 1	16 Antirrhinum majus, großes Sobelinaus of 5								
		noutibe St.	Br. 1	17 pumilum Tom Thumb, leuchtene, fuchettig,								
	60	23642 2 642 2		rupestre, eine gang meetige det zu change								
	60	Abobra viridiflora § TF. Schone Cucurbitacee mit glanzend gruner Belaubung und icarlachrothen		striatum, gestreifte Barietaten, gentigit.								
		Früchten . Abronia umbellata, bolbenbluthige Abronie * TF	1	2 F Sunfelhlau								
		Accorde albigans meiftliche Afazie, b.T.	2									
	63 64	argyrophylla, tilberblattr. a		123 , Skinneri. Smartametry met gett, tine								
	65	- and ata vaich him and into left sittliff	1									
	67	Gordana tendentrijde U. 5 Farnesiana, Hangblättrige U. lophanta, büjdelblittbige U. lophanta, büjdelblitbige U. lophanta, büjdelblitbige U.		126 Arctotis breviscapa, furzimalinges Survey.								
	68	Gine der bettebtelten Statistet 1888	5	sulphuren ichmefelgelbes B								
	69	" Neumannii, Reumanii 5. W	14	127 7 7 Surplication, Johnston								

Ro	A STATE OF THE STA	Le otl	Br.	Ma	(\$10.9) 	Loth	OM THE
128 129 130	mohn. 4 T. 2 Fb. b., weißblübend	6	1 1 1 1		3. apfelblüthen 8. bunkelcarmoifin 4. roja mit weiß 9. violet 5. dunkelroja mit weiß 10. dunkelviolet 6. carmoifin 11. dunkelblau 7. carmoifin mit weiß 12. violetbraun mit weiß 13. dunkelblau mit weiß	1 2 3	Sgr
	Alftern.	E ,	207	142	Jebe Farbe à 1000 Korn 5 Sgr., à Prise 1 Sgr. Dieselben gemischt .	71/2	1
	Sebes Sahr bringt uns neue Formen, neue Nu- ancen, bie Jücher wetteifern mit einander in Bervollkommnung biefer herbifthorblumen und fein Garten, fein Gartchen fann biefen Schmud mehr entbehren.	8. 0. 0.	205 209 210 210 211	143	Die Bflanze wird nur g Buß boch und ist mit ihren icon gesormten, zierlichen Blumen soroohl im Lande wie in Löpfen außerordentlich ansprechend.	Tab.	156
132	Bäonienblüthige Byramiden-After. (Truffaut's Perfection.) Sebr gefüllt und schön gesormt mit großen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, pracht voller Bau und herrliche Farben.  1. weiß (rund gebant) 2. rein weiß (lodig) 3. weiß mit carminr. Herz 10. weiß mit schwarzblau	Can	213 215 215 216 217 218 219 220 220	01 3 144	1. rein weiß 7. kupferbraun 2. weiß mit carmin 8. dunkelroth mit weiß 3. pfirsichklüthen 9. helblau 4. dunkelrofa 10. dunkellila 5. hellcarmin 11. violet mit weiß 6. carmoisin mit weiß 12. dunkelblau 3ede Farbe à 500 Korn 4 Sgr., à Prise 1 Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 6 Sgr.	12	1
133	4. la superoc (prachtg ros 11. aptelblithen fenroth, ertra größt.) 12. lebhaft röfa 5. carmoifin 13. feurig carmoifin 6. victoriaroth (lenchtend 14. violetroth feuerroth) mit weiß 15. rothbraun mit weiß 7. dunkelcarmoifin 16. schwarzhl. m. Altahgl. Jede Farbe à 500 Korn 6 Sgr., à Prise 1½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 8 Sgr.	20	922 923 924 925 927 928 928 928 928 928	145	Awerg-Bouquet-Phyramiden-After.  Im wahren Sinne des Wortes Blumenpyramiden en miniature bildend.  1. rein weiß 2. fleischfarben 3. bfirschblithen 4. rosenroth 5. carmosth 5. carmosth 6. carmin mit weiß 7. hellblau 8. lajurblau mit weiß 9. violet 10. buntelblau 3 ede Farbe à 500 Korn 6 Sgr. à Prise 11/8 Sgr.	Hed Hed Hed Hed	
134	Chrysanthemumbliithige großblu-		IES	146	Dieselben gemischt 1000 Korn 8 Sgr	30	1
1 1 10	Eine bet empfehlenswerthesten Formen, die bei iconer Farbung und tadellojem Bau ber Plumen sich durch niedrigen Sabitus, reiches und früdzeitiges Abitus, reiches und früdzeitiges Iliben auszeichnet.  Daburch, baß die Blumen in gleicher Sobe stehen, eignet sich diese After wie keine andere zur Bepflangung von Arabesken.  1. rofa 2. belibsau 3. refn weiß, im Beradung ber Belibsau 4. burfelbau 5. refn weiß, im Beradung ich ber Beradung ber Beradung ber Beradung ber Belibsau 6. ber Belibsau 6. bei Belibsau 6.	Die	232 234 234 236 236 237	147	Thlands-Lifer.  Cine ber schäftbarten neueren Jüchtungen. Die sehr großen Blumen sind denen der Päonienaster ähnlich; die Pstanzen verzweigen sich start.  1. sichneewiß 2. rosa u. weiß 3. carmoisin 3. carmoisin 4. helbsau. 5. lebhast rosa mit weiß 6. carmin mit weiß 6. carmoisin 6. berillant lisa. 6. benstlan 6. denen sichne sichne sichne 6. denen	HE HE	
135	Diefelben gemifcht 1000 Rorn 8 Ggr	30	233	147a 148	Dieselben gemijcht 1000 korn 8 Sgr	30	1 271 271
136	Cocarden-Zwerg-Chrhsanthemum- Uster. carminroth. Sine constante, schöne, lebhaste Cocarden- After unter den so sehr und mit Recht besieden Zwerg- Shrhsanthemum-Astern 100 Korn 6 Sgr., 25 Korn 2 Sgr.		240 242 242 243 244 244 245 247	10 H H 10 10	Eine reizende reichblübende Sorte, mit zierlichen, dicht- gefüllten kugelförmigen Blumen. 1. rein weiß 6. violet mit weiß 2. weiß mit dunkelblau 7. braunviolet mit weiß 3. rosa 8. dunkelrosienroth mit weiß 4. carmin 9. hellblau mit weiß 5. carmin mit weiß 10. dunkelblau, neu 11. carmossin, neu	Cal	
137	3 werg-Bouquet-After. (Bolge) Sehr confan im Hobitus Angerk zierlich.  1. weiß mit rothem Herz 4. bunkelbiolet mit weiß 2. dunkelcarmin mit weiß 5. weiß mit dunkelblau 3. carmin mit weiß 6. carmin	90 90	248 249 250 251 251 253 253 253 253	149 150	Jede Farbe à 500 Korn 6 Sgr. à Prise 11/2 Sgr.	30	1
138	7. rosa mit weiß Jede Farbe à 500 Korn 5 Spr., à Prise 14 Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 7 Sgr.	20	1½		Mit brillanter Zeichnung. 1. carmoifin 4. roja	8	
139	Feder- oder Röhr-After. Beliebte, schön gefülte Form. 1. rein weiß 8. dunkelcarmoisin mit		250	1	2. dunkelroth 5. dunkelblau 3. hellblau 6. braunviolet 7. rötblich ila Nebe Karbe à 500 Korn 5 Sar., à Brise 14 Sar	8 Ca	er er
	2. filberweiß 3. weiß mit rothem Herz 9. himmelblau mit weiß 4. pfiridsblithen 10. lita 5. rofenroth 11. violet 6. carmoifin 12. violet mit weiß 7. dunkelcarmoifin 13. dunkelblau		261	151 152 153		10 0 1 2 8	2½
140	3ebe Farbe à 1000 Korn 5 Sgr., à Brise 1 Sgr. Dieselben gemischt	71/3	1	\$	Gemiß die iconfte aller Aftern. Die Blumen diefer Gattung find imbriguirt, bochgewolbt-kugel-		
141	Rugel-After. 1. weiß Die Blumen groß und regelmäßig. 2. fleischfarben	10		1 1 1 1 1 1	blütbig, ftarkgefullt und febr größblumig (bis 530fl). Der Habitus der Pflanze it febr robuit, ppramiden- förnig. Die Bflanzen müssen, menn ein gutes Kejultat erzielt werden joll, 1½ Buß im Quadrat gepflanzt werden. Giebt sehr wenig Samen.	3 10	

		-	_ 1	2 -		24461	97 4
The	Hope	Loth	Pr.	No	002	Sgc	Fgr.
		Sgr	Sgr	790	Callirrhoea pedata nana, bon niebrigem Buchs und		201
	1. weiß	.8		203	authorordentisch reich und lande biudend	AF	2
	2. carminrola 8. rein bellblau			204	verticillata. Renere jehr großbiligende Species,		3
	4 hellblau mit weiß 9. rein duntelblau, neu			205	prachtvoll	0	4
	5. buntelblau mit weiß 10. carmoifin mit weiß, neu	-1	100	P.	blau Beibe 1 Ff	8	1
	Rebe Karbe à 500 Korn 15 Gar., 100 Korn 4 Gar.		200	206 207	" Medium. Marien= G. & F. Sehr großblumig blau		1
153a	Diefelben gemischt 1000 Korn 15 Sgr., Lth. 75 Sgr., Br. 24 Sgr.		1162	12	migneirt 2 kg	6	1
154	Aster tanacetifolius, roinfarnblättrige Sternblume.		1	208 209	" fl. albo, weiß. " , fl. pl, gefülltblübenb		2
155	Litafarben. 1 Guß hoch. * FT tenellus, zarte Sternblume. Simmelblan	7	1	210	nyramidalis. & 4 F. Gine bet lubiliten, in migen	12%	1
156	Astrantia helleboritolia, großblumige Sternboide.		11/	211	n. albo, weißblühend	15	11/2
157	Atriplex hortensis purpurea, purpurr. Melbe. OF.	1	1½	212	" 11 11: d OI F reizend ichon	4	1
	4-5 gus bod. Decoratio	2	1 3	213 214	soldanelfflora, 47: etgelb 130 f. 1-14 8f. h., blau Beculum, Benusspiegel. 10 f. 1-14 8f. h., blau f. f. albo, weißblühend	4	1
158 159	Aubrietia dettoidea, *4 F. fehr niedliche Albenpflanze "graeca, (Griesbach). Reu. Diese schone Frühlinge.		0	215	grandiflora, großblumtg	4	1
	blume ist eine werthvolle Bereicherung der grei-	-0	10	216 217	Canna, Blumenrohr. 24 TF 10 Korn 2½ Sgr.		
160	Azalea pontica. DF. Bon Prachtsorten gesammelt		5	218	fulgida		1.3
161	Baptisia australis, subliche Bapt. 4 F. 3 Bus, icon		1	219 220	" discolor floribunda 10 " 3 "		
162	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie OF	4	1	221	gigantea	3.	-
163	Begonia diversifolia. 4(.) TF. Bracht. Gruppenphange	10	3	- 222 223	hybrida Warsczewiczi 10 7 2 7		
164	Bellis perennis fl, pl., Taufenbiconchen. *4 F. Bon ben iconften bichtgefüllten Gorten gefammelt	mit	5	224		16	
165	Didane etrocanguinans (Ortgies) Dahlia Zimanam	1.1	1	225 226	mulleri	-3)	
	(Roezel), OTF. Schone Gruppenplanze mit		3	227	nigricans	.5	
166	Bocconia cordata, 24 F	4 .		228 229	" Sallowi		133
167	, japonica. Reu	-10	13	230	" Melange ausgezeichneter Sorten 10 7 1 "	5	
1-	gang besonders die lettere. Gie find prachtvoll	1	116	231	Cannabis sativa var. gigantea, chines. Riesenbanf OF. Deforative Gruppen- und Ginzelpflanze	13)	131
	belaubt, erreichen eine hobe von 5-6 Fuß, und ertragen unfere Winter vollständig ohne Dede.	-		1	von 12-15 guß Gobe Pfeffer. OTe.	4	1
168	Brachycome iberidifolia, iberieblättriger Rurgichopf.		147	232	Die Früchte fehr zierent, in mehreren Barietaten	4	
	iberidifolia fl. albo, weißblühender R		1%	233		5	1
169 170	Browallia abbreviata (pulchella). OTF. Niedrige	-	12	234	Craftian aggianet	5	1
7.0.7	reizende Bflange. Die gablreichen Blumen buntel-	D. I	4	236			
171	rofenroth mit weißem Auge		1	1	1. goldgelb		
172	" elata. Duntelblau	1	1 1		Jehe Karbe à Br. 2 Car.	1.1	11/
173 174	Bryonopsis erythrocarpa & TF. Schlingpflange mit		-	237	Diefelben gemischt 1/8 Eth. 5 Sgr	2	13
TIT	THE DELLEGATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		3	238	1. ichmefelgelb	10	
175	Früchten		2	1	2. goldgelb	1 .	
176	lateritin, siegelroth	Calle .	1 1 148	239	Sede Farbe à Br. 3 Sgr. Centaurea americana, amerif. Flodenblume. OFT	.0	
	Beibe gehoren gu ben verwendbarften Schling- pflangen.	-		f	4-6 Juß, mit großen Blumentopfen und titu	10	18
177	Calampelis (Eccremocarpus) punicea, bunfelrothe		2	240		1	0.91
178	Schönrebe. & D. TF. scabra, icharfe Sch. Scharlachroth	miS	2	241	Cyanus. F. In versch. Farb	23/	1
179	Calandrinia grandiflora, großblumig purpurroth	. 6	1	243	depressa, 1—1/2 Ob. 4-4 tecquit com	4	1
400	speciosa, C. * TF. Glanzend purpurroth		1	24	gymnocarpa, DTF. ilberblattr., 10 Korn 4 Ogt.	on comme	1
180 181	umbellata, bo TF. Dunfelpurpur		2	243		(I) (I)	3
182	Calceolaria hybrida. J.T. Bantoffelblume, pracht getieg., von Blumen I. Ranges. 1000 Korn 4 Ggr	5. 14		24	moschata fl. albo, weiß, bijamouftend. OF1	4	1
183	gotuicht ichone warhungen. 1000 - 4 "			241			1
184	" nan, Zwerge, von fraftigem, gebrungener Buchs, außerorbentlich reichblubenb. Bon Blumer	1	611	25	Centauridium Drummondii, OF. 2-38. b., goldgelb	8 4	18
	I Manaes 1000 Morn 4 Sat			25 25			1
	Eine aussührliche Aulturanweisung für di frantartige Calceolaria steht gratis 31	1	0.0	25	3 , fl. carneo, fleischfarben	6	1
	Diensten.		2	25 25		10.	2
185	rumaga itranchartine 18 D.T.F.		-	1 -0	Die ganze diffante ill libelibeth und befonders	2	200
186	500 Korn 10 Sgr., 100 Korn 23 99	r.	-	25	im Rafen von großem Effett. 8 Chaenostoma fastigiatum, *horf. 12/2 &. b., roth		2
187	" scabiosaefolia. O TF. hellgelb früh und reich		1	25	9 fastig. fl. albo, weißblugend		1
188	Colondula Pongei fl. pl., gefüfft blubende Ringel	* 8	1	26	o poryanthum:		
	blume. OF.		2		th 10ch a line was a line of the later was the line of the later was a line of		
189	Callionsis (Coreopsis) Atkinsonii, bielblum. 40	T. 5			Sommer-Levkoyen.	TI	
191	biggles and bagin mit bunte proud	. 0	1		(Cheiranthus annuus.)	14 3	
193		. 7			Befte Qualität in Topfen gezogener Camen.		-
_ 19	n nand, metriges	: 8	1	26	Con Y Camman Ochfaha	7. 01	
19	atrosanguinea Dunteirpip	. 20	2	3	8 Sunfelcarmoilinroth		
19	ny nybrida, Stuppens und Singerplaning , and	. 12	36 5		2. roja mit gelbem Schein 9. blagblau mit gelb. Sche	ın	- 01
19		8			4 carmin 11. hellviolet		1
19	oronata Drummondii (basalis), 2-3 & h. glangend gol	. 4			- Sunfalcarmin 12. Duntelviolet	1	
20	gelb und braun  nigra speciosa, Dunfelblutbraun  """  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""	4		1	6. bunfelziegelroth 13. bunfelblau 7. carmotiin 14. bunfelbraun	m .r	
20	Callirrhoea pedata, OFT. Carmoifinroth						

No	100	Loth Sgr	Pr. Sgr		109	Soth Sgr	Br.
262 263	15. dunkelschwarzbraun 17. helfziegelroth 16. victoriaroth (leuchtend 18. lila dunkelcarmoisin) ertra 3ede Farbe à 500 Korn 4 Sgr., à Pr. 2 Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 6 Sgr., Landsamen von engl. Sommer-Leutopen, sehr sorg- jam gezogen.	40	11/2		unter den Levfoyen.  1. rein weiß (nein) 2. canariengelb, Lackblatt 3. chamois 4. duntelroja 5. carmin 5. carmin 6. den Sede Karbe à 500 Korn 5 Sax, à Prife 22 Sgr.	500	275
264	Großblumige englische Sommer-	1.72	360	279	Diefetben gentifcht 1000 Korn 8 Ggr	55	2
	Tevfohe.  Sehr empfeblenswertbe Levfohe, ausgezeichnet durch robusten Wuchs und lange Blutbezeit.  1. weiß 2. steischfarben 9. dunfeltarwoisinroth, (neu) 4. aurorafarben (neu) 10. bellblau	u3 u3	362 263 264 265	280	Durch stärfere Berzweigung und längere Blüthezeit ausgezeichnet.  1. rojenroth 3. hellblau 2. carmoifin 4. bunkelviolet Robe Karbe à 500 Korn 5 Sar. 2 K Sar	52	2
	5. rosa 11. violet 6. carminrosa 12. dunkelblau 7. carminroth 13. ziegelroth	ψO		282	Gulle. Getolt, part Oulitten.	Ch	
265 266	14. hamois Sebe Farbe à 500 Korn 4 Sgr., à Pr. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 6 Sgr. Landsamen von großbl. englischen Sommer-Lev- kopen, sehr sorgfältig gezogen.	45 17½	1½	1 18	1. weiß (mit Lackl.) 5. hellblau 2. resenroth 6. dunkelblau 3. carmin 7. sleischfarken 4. carmolfinroth 8. ziegelroth Rebe Karke & 500 Konn IV. Sak. & Rr. 3 Sor.		
267	Mene großblumige Sommer- levkope.	Da	E78	283	Diejelben gemijcht 500 Korn 6 Sgr	80	2½
	immefelgelb, febr icon, 25 R. 2 Ggr., 100 R. 74 Sgr.			284	Frühblühende englische Herbst-		
268	Rwerg-Sommer-Lebkohen.  1. fleischfarben 4. helbslau 2. carmin 5. dunkelbslau 3. fupferfarben, großbl. 6. schwarzbraun Lebe Farbe à 500 Korn 5 Egr., a Br. 23 Sgr.		B18 B78 B78	181	Die frühblubenden herbst-Leutopen find febr gu empfehlen. Mitte Marg ausgesaet und Anfang Mai verpflangt, entwideln fich ibre Blutben Unfangs August, und bluben, bis fie ber Frost gerftort.	10	
269 270	Diefelben gemischt 1000 Korn 8 Sgr	55	2	1	1. dunkelblau 4. blahblau 2. carmin 5. braunviolet mit Lackbl. 3. weiß 6. carmin mit Lackblatt	D	
210	Levkohe (großblumig).	De		285	Sebe Farbe à 500 Korn 71/2 Sgr. Diefelben gemifcht 500 Korn 6 Sgr.	80	3 21/2
271	Gegen 9 Zoll hoch, außerordentlich ichon. 2. lachstrofa 6. dunfelblau 3. brillant rofenroth 7. rothbraun 4. carmolin 8. achgrau Rede Farbe à 500 Korn 7% Sgt.	eu .	3	286	Großblumige Kaiser= (perpetuelle)  Levkope.  Die großblumigen Kaiser-Levkopen übertreffen bie ätteren Sorten durch größere Blumen und ichoneren Bau; blüben auch zeitiger als leitere.		
	Neneste Riesen= oder Baum-Som= mer-Levkope.  Bis 2 Buß und mehr hoch, sehr reich und lange	75	2½	287	1. rein weiß 5. carminroja 2. braunviolet 6. helblau 3. pfirfichblüthen 7. blakroth 4. roja (Lugelblüthig) 8. carmoifin Sede Farbe à 500 Korn 71/8 Sgr.	80	3 2%
272	blubend. In iconen Farben gemischt 100 Korn 4 Sgr		2½	288a	Berbesserte Winter-Levkope.	ci	
273	Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt.  1. weiß (kugelblüthig) 2. ichwefelgelb 3. fleiichfarben 9. dunkelviolet		288 305 160 160	10	Schöne Sorten, die große Stöcke bilben, und gut gefüllt fallen. 1. weiß 5. carmin 2. ichwefelgelb 6. helblau	7 00	
274	4. piritabluthen 10. dunkelblau 5. carmin 11. rethbraun 6. dunkelcarmoisin 12. schwarzbraun Jede Farbe à 500 Korn 4 Spr., à Pr. 2 Sar.	0	394	288b	3. rosa 7. dunkelblau 4. feuerroth Jede Farbe	03 6	2½ 2
275	Landfamen, forgfältig gezogen	18	1½ ee	289	Cocarden- oder Stangen-Winter- Levkope.	00 0	
210	Immerbl. Sommer = Levkohe.  Bei diefer L. läßt sich durch Aussichneiben ber abgeblübten Blumenstiese der Flor vorzugsweise lange ausdehnen.  1. weiß  5. rofbarau	1	101	1	Extra in's Gefüllte fallende Sorten.  1. fonigeblau 3. weiß 2. carmin 3che Karbe 100 Korn 24 Sar	10	
277	2. fleischfarben 6. dunkelblau 3. ziegelroth 7. rothbraun 4. carmoifin 3ebe Farbe à 500 Korn 4 Sar. à Br. 2 Sar.	0	101 01 101 04	290	Diefelben gemijcht a 500 Rorn 5 Sgr	. 78	2
278	Neue großblumige Phramiden=	15	1½	291	(Cheiranthus Cheiri.) Golblad, ertra gefüllter brauner Stangen- 1000 Rorn 10 Sgr.		
	Sommer-Levkope. Diese Züchtung ist wohl das Bolltommenste		01- 01- 14-	292	, , , canariengelber , 1000 Korn 25 Sgr., 100 K. 3 Sgr.		

			14			1
		2 oth	Pr.	Mar	Poth Br. Sgr. Sgr.	
No	Golblad, ertra gefüllter, 1000 Carn 25 Sax.	Sgr	Sgr	950	Convolvulus tricolor, splendens. Brachtig lilaroth, violetroth und	1
293	Golblack, extra gefullter, 5tangen. 1000 Korn 25 Sgr. 100 " 3 "			356	indigoblau mit heuem Grunde. 5 1	
294	" " brauner Zwerg - Busch = 1000 " 15 " 1000 " 2 "			357 358	" "Pring Puridgeanum, OFT, 2 %, both, fdwarg.	
295	blauer Zwerg-Busch= 1000 " 25 "	1.0		359	roth mit gologeto 1 & b. gedrangtwüchfig,	1
296	hroncefarbiger Busch. 1000 " 25 "		279	360	Engelmannt, OFI. 1 8. 9. gettingen, 12 2 glängenb gelb	
297	inter rein bunfelbrauner großbl. Buich	8	1 1½	361 362	filiforme, 2-3 yug you, took gergenend.	
298	" amahnlicher brauner Buid, ohne Bededung im	10		502		
299	Freien aushaltenb . Meerftranbs-Levfoye. * F. Cheiranthus maritimus, Meerftranbs-Levfoye. * F.	4	1	Viv.	fassungen Occurbita, settene und schone Arren, Cucumis und Occurbitaceen Seite 9. 94 Sar.	1
300	— 1 guß hoch, lebhaft roth	21/2	1	363	Cuphea eminens, Dorr. praction 30 stein 22 35	
301	Chelone (Pentastemon) barbata, 4011.	8	1½	364 365	militata, memana voidhfirhende (5	4
303	Sinnoberroth . Chenopodium Atriplicis. OF. 4-5 Ff. hohe Grup-	6	81	366 367	" platycentra. Setunite tetach Großblumig	
304	Charge anthemum carinatum album. OFT	5	1 1%	368 369	Cyclanthera pedata, golf. Raidmachiende icon-	
305 306	carinatum atrococcineum,	40	1%		belaubte Schling blungen. Erüchte merden eingemacht.	5
307	n purpureum luteum . Buridgeanum, breifarbig Dunetti fl. pl. Gefüllt weiß .	5 5	1	370 371		î
308			2	372	Cytisus Attleyanus, DT	
310	jamarpurpur jamarpurpur Sämmtliche Carinatum-Barietäten bariiren.	4	882	373	Betbe ich get 3-4 guß boch, mit	
311	" coronarium fl. albo pl., weiß gefult niebric	3 4	1	374	großen, weißen und bieteren	1
312 313	, luteum nanum fl. pl., goldgelb, niedrig japonicum fl. pl., 4T. variirt bedeutend, so bai	3	6	37	Unhapiana varietates. Son ott	
314	Man fort und ibtt nene Beinen and Janges ge	s		1	iconen D. Huberialia in f. w. gezogen wor-	21
315	ammett.	it		37	ben, dieselben gemischt meingefüllt 5	1 1
316	Wahii haumartia his 20 4 K, und darüber h	.,		37	7 , fl. coeruleo pl., icon blaugeflut 2 - 3 lb. v. 8 humilis flava fl. pl., niedrig geibgefüllt	2
310	in vielen ichonen garben und mitt geben Studen			37	9 Metel, mit großen, loeigen, teene 4	1
31	Clarkia elegans, Orl. oleanherhluthia gefüllt.	5	1	38	meteloides. Blumen fent giby und buften. 5	1
313		. 4	1 1	38	10 Rorn 24 Sgr.	
32	pulchella, roth .  alba, weiß .  " alba, weiß .  " fl. pl., gefülltblühend. Bariert noch . l  " verah Marietät	. 2	1 2	383	la Delphinium Ajacis Clause	
32 32			1		Ritteriporn. Or.	1 1
32			5	388	Bb newym f nl., niedriger gef. R.	1
32	6 , nana, niedrig	. 9		1.0	6 prachtige Karben, leve 4  Diefelben gemischt , hyacinthen-	1
32	8 Clematis erecta, 4r. othe purpose Charles	n. I.	2 2	1 2 2 2 2	5a , Ajac. hyacinthistorum fl. pl., hyacintgen- bluthiger gef. Rittersporn	1
32	Olianthus Dampieri, Dampier's Brachtwick. L4. Glübend prange-scharlach, überaus prachtvoll. D	T.			amicht 4	1
	Pflanze ift febr empfindlich gegen anhaltende Raf			38	56 Cancolida ff. pl., gefüllter Levkoyen-R.	1
3	Brillont icharlach, 5 Korn 5 C	ar	187		8 garben, tentent	1
	puniceus, dunterroth	D=	ив		6b Steeleben gemidy 4 87 cardiopetalum. Biolet 45 guß. 4F. 6 88 chinense, greßblum. perenn. 4—5 guß. 4F. 6	- 1
	letten gleden, ichon maisklinkend			3"	Leuchteno plan in manning	213
3				3 3	390 , pumitum atrococrateum, cardan	-
	Cobaea scandens, ShoTF. ungemein tald ibu			1 3	hybridum fl. pl. chefrantifficial of the state of the sta	
0	letten Bluthen Schlingpflanze mit icon	ier			7 " Cara Charland indianhlan, aroks	
	Belaubung, ichneeweigen gibuen binigen Orni	ch=		282	blumig, 3-4 848 Fuft. 22F. Biele	15
	und reizenden bunteitarminteligen gittigenet get	eiß	2	1	practige Furben gentliche fallend 20	
	ten				397 ", fl. pl. Statt in Schutter bunkelroth	1
	grandino a, gespet 141 " candidissima, retuweth		4 3	1	399 " caryophyllus fi. pl., genute Meter Bon Rummer-	
		ioi I	4 2	1	blumen 1. Manges 30 steen * CFT 6	
			8	1%	402 ", fl. albo pl., weißbullend gel	
	347 " alba, weth		8	11/2	404 " fl. rubro striato pl., rothgestreift, get	
	348 7 7 Striatinora, generalization				in practigen Rame Diese Marietat ift	
	2-3 guy bobe Steetplinigen.  2-4 guy bobe Steetplinigen.  2-5 guy bobe Steetplinigen.	par-		4	10 fein gegetchiet, we 21/ Car	
	tteen geetgiet . Blau u mein mit gelbem Gri	inde	11/2	1	407 Compactus fl. pl. Riedrige Barietat von	
	351 " fl. pl		3 11/2	1	gebrungenem Bau  gebrungenem Bau  nanus atrosang, fl. pl., niebrig, buntelblutroth  Heddewigii. Sebr großblumig  Heddewigingenem Bau	
	353 " fl. albo, weiß		2 2	1 1	409 " Heddewigii. Sehr großblumig	
	355 speciosus atropurpureus, jchön		4	4 8	7 7 7	

## Plumarius. Hefe. *\(^2\)F. Bef. Pflanze für ginfassungen *\(^2\)F. Bef. Pflanze für *\(^3\)F. pl., scheftigen gefüllte (Pinks), bef. schone Rerlanze Feuchtigkeit und Woodern 100 Korn 10 Szt., 25 Korn 3 Szg *\(^4\)F. Polictamnus albus, weißer Diptam 2-3 Fuß. \(^2\)F. rober, rother Diptam 2-3 Fuß. \(^2\)F. rober, rother Diptam 2-3 Fuß. \(^2\)F. serreginea. Der Blithenstength boch. \(^2\)F. \(^3\)F. splendens. \(^3\)F. \(^3\)Ferreginea. Der Blithenstength Boch. \(^2\)F. \(^3\)F. \(^3\)Ferreginea. Der Blithenstength Boch. \(^3\)Ferreginea. \(^3\)F. \(^3\)Ferreginea. \(^3\)F. \(^3\)F. \(^3\)Ferreginea. \(^3\)F. \(^3\)Ferreginea. \(^3\)F. \(^3\)Ferreginea. \(^3\)F. \(^3\)Ferreginea. \(^3\)F. \(^3\)Ferreginea. \(^3\)F. \(^3\)Ferreginea. \(^3\)Fer	Sinne bes Wortes, eerbe. oth, 1—14 Ff. 24F. Eine neue rofen- Sommergewäches g Tuß hoch	10	2½ 2½ 1½ 2 1 1
## Plumarius. Feder-Reffe. *4F. Bef. Pflanze für Ginfassungen.  ## Plumarius. Feder-Reffe. *4F. Bef. Pflanze für Ginfassungen.  ## Plumarius. Feder-Reffe. *4F. Bef. Pflanze für Germarius.  ## Plumarius. Feder-Reffe. *4F. Bef. Pflanze für Gine Berlanze für Germarius.  ## Plumarius. Feder-Reffe. *4F. Bef. Pflanze für Germarius.  ## Plumarius. Feder-Reffe. *4F. Bef. Pflanze für Germarius.  ## Plumarius. Feder-Reffe. *4F. Bef. Pflanze für Gine Berlanze für Gerlanze für Gerlanze für Gilia achilleaechia fi. roseo. OF errefte Barietät biese Befannten.  ## Plumarius. Feder-Reffe. *4F. Bef. Bef. Pflanze für Gilia achilleaechia fi. roseo. OF errefte Barietät biese Befannten.  ## Plumarius. Feder-Angelie im Mode.  ## Plumarius. Fed	Sinne des Wortes. crebe. crebe. forb. 1—14 KB. AF. Cine neue rojen. Sommergewächjes g Tuß hoch	10	1½ 2 1 1 1 1 1
Geum atrosanguineum, dunfelbunt Moo Moo Geum atrosanguineum, dunfelbunt Moo Moo Geum atrosanguineum, dunfelbunt Gilia achilleaefolia fi. roseo. Of rothe Barietat biejes befannten 100 Korn 10 Sgr., 25 Korn 3 Sgr. 25 Korn 3	rerbe. foth, 1—11% Hb. 21°C. Cine neue rojens Sommergewächjes Huß hoch		2 1 1 1 1 1
Nelte mit pracht. Zeichnungen.  100 Korn 10 Sgr., 25 Korn 3 Sgr.  100 Korn	Eine neue rojen- Sommergewächjes Fuß hoch	3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4	2 1 1 1 1 1
distamnus albus, weißer Diptam. 2—3 Suß. 4F. 25 468 , major rober Diptam 25 25 469 , major nivalis Buxbaumi. 4—5 Suß boch. 72F. 10 1 470 , ferruginea. Der Blütbenitengel bildet jchöne, jchlaufe Byramiden. 5—6 Suß. 75 15 472 , splendens. tricolor. Beliebte Sommerblu 25 473 , purpurea. 4 1 474 475 475 475 475 476 Glancium luteum. 24FT.	Stauben. Stauben. Stauben if nieber- hen lich die schnen ber rich die schnen	3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4	1 1 1 1
117 Digitalis Buxbaumi. 4—5 Kuß boch. 24F	Stauben. flanze mit nieber- ben sich die schönen b erheben. Erträgt	3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4	1
19 , gloxiniaeflora. Prachtvolle großbl. Barietät	Stauben. flanze mit nieber- ben sich die schönen b erheben. Erträgt	2½ 2½ 2½ 4 4	
420 , purpurea	Stauben. flanze mit nieber- ben sich die schönen b erheben. Erträgt	2½ 2½ 4 4	1
422 Dodecatheon Meadia, virgin. Götterbi. 4F, 13 § 5 5 476 , phoenicenm	Stauben. flanze mit nieber- ben sich die schönen b erheben. Erträgt	4	1
	flanze mit nieber- ben fich bie iconen b erbeben. Erträgt		1
424 Lablab Mit Auß hohen, mindenne Stennel unb	berbeben. Erträgt		12/0
atrosanguineus, hochroth			
Die Dolichos berlangen eine warme Lage. 478 Gloxinia hybrida, ATW. 26 Dracocephalum moldavicum. OFT. 14-2 85. b.,		1	W.C.
127 g. fl. albo, weißblübend		1.	
428 , virginianum, AF. Hellpurpur, an feuchten Stand- orten 5 – 7 H. hoch und fehr decorativ	Tomenemite un		
blauen großen Blumen, empfehlenswerth. verein prämiirten Cammlung	und können die-		
Eccremocarpus tiehe Calampelis.  480 Godetia amoena. OF. 11/2-2 85. Y	dings) isnato	3 3	1
gette Cine laben Stuppenpitunge	uldarid	3	1 2
434 Eremostachys laciniata. 4F. 2-3 Fb. Schneeweiß 485 Gomphrena globosa alba, weißer	Rugel = Amarant.	6	1
435 Eriogonum umbellatum (Torrey). Aff. Intereffante 486 carnea. seifeitofarbig	Diefelben gemisch	5	1
Species, niedrig, hart, und reichblühend; mit fomalen, eifdrnigen Blättern und einer Menge 488 variegata, bunt.	francili ene ki	5	1
schmalen, eisenmigen Blättern und einer Menge in Dolben stehender kleinerschlisselblumfarbe- ner, sehr oft mit orangebraun punktirten Blu- men. 25 K. 3 Sac. 440 Grammanthes gentiangides. Or	n. 1½—2 Ff. h.	6	1
436 Erodium Manescavi, 1 Fb. 4F. Burpurroth, prächtig überaus zierliche Sommerbl	ume für sonnige,	200	
etimen no portreffic in Charametern 94 491 Gynsophila elegans OF 14 9 8		2	5
	ch-weiß. Die zier-	6	1½
Bradipflange 25 Korn 3 Sgr.    439 Eschscholtzia californica. *	ts	5	1
440 , alba, weißblühend 3 1 blübende afferliebste Zwergi. 441 crocea, safrangelb 3 1 495 Hedysarum coronarium. d © E T	rm	i	2
442 Eucharidium grandiflorum. * F. 14 35. hod, roja 496 , fl. albo, weißblühend		4	1
443 , album, weiß	ounenhlume OF	6	1½
firming John of citronacy is	üthia	4	1 1
Atte Eutoca viscida. F. 1-2 &B. B., leuchtend smalt-	ocarvilles cather	6 5	1
		10	2
449 Evonymus fimbriata by Reue and Tanan singsfilling	mon smuibleojo no	5 5	1
450 , japonica	sum fl. pl. gefüllt	T	N.
451a , fol. arg. var	visinroth irrothe Rüancen		
452 Fenzlis diantiflora 'OTF 2-3 20ff hach highlifte.	roth.		
Commergemachte, beinnders tur garte (kinfais) 508 Bornesgrum roy rain	veiß, regelm. ge-	12	1
453 Fritillaria imperialis, Raiferfrone. 2 guß. 24F 1 509 a atrosanguineum nanum.	hochroth, ertra	:	2 2
vallardia aristata, gegrannte Gaillardie. 4F. 2-3 g 1 511 , compositum nanum, febr gebra	ngt	. 00	21/2
457 , grandiflora	orm gehoren die erthvollsten 3m-		
a lyrata, leterplatification of F office	afische Niekmurz	. 118	3
9 pieta. (T. Beliebte Zierpflanze. 5 1 514 , atrorubens hybridus, schön . 460 , marginata, weißgeranbet, prücktig. 7 114 515 , foetidus . 469 , Josephus. Pr. Größlumig, schön . 8 12 , Sebr frühölühende zu empfehl	H28941 QHA 178	10	3
verniern. Sehr reichbluhend 5 1 516 Heracleum giganteum. 6-8 86.	F. may - It Flam . F	5	1
in langen iconen Rispen blubend 5 1 Blattpflangen von riefigen Din	enftonen		1
and a second sec	ole. 4F.	4	1

			- 10	3 -		0-12	m.,
Rol		Loth	Pr.	No	anthus chinensis	Sorth Sgr	Pr. Sgr
519	Hesperis matronalis  n. fl. albo. weißblühend	Sgr. 5	Sgr 1	556	Ipomoea Quamoclit (Quam. vulgaris.) § TW		i
520	" tristis. 624F. Befiebt megen bes foltlichen Duftes,	6	601 601	557 558 559	Ipomopsis Beyrichii. OTF. 3—4 &B. b. icharlacht. elegans, rothblühenb		1½ 1½ 1½
521 522	melden sie Abends berbreiter. Hibiscus calisurus, großblumiger Cibisch. OTF Hieracium aurantiacum. 4F. Sehr schne bril-	4	1 21/2	560 561	superba . Iris hybrida, Schwertlilie. 4F. Melange ber prach.	ıa	1½
523 524	lante Farbe Humea elegans. & TF		3	562 563	gelb gestedt	DI	2 2 2
525	gelben Blumen	2½ 2½ 2½	3 1 1	564 565 566	Kaulfussia amelloides, blaue Raulfulita. *OFT  " fl. roseo, rejenroth and bliscina bT.	5 6	1
526 527 528 529	, odorata, wohlriechend, weiß	3 3 4	1 1 -1	567	Kennedya (Hardenbergia) ovata lilacina. ht. Brachtige Barietat ber iconen alteren Species. 10 Korn 3 Sgr.	Doi	423
020	Baljaminen. (Impatiens balsamina.)			568	Lasthenia ylabrata. OF. 1-14 88., icon golbgelb	4 5	1
530	Gefüllte Balfaminen. 5. weiß mit violet	GID	478	571 572 573	A. albo, rein weißblühend, sehr icon	7%	2 2
	2. ica 3. lila 4. dieifarbig (weiß, Iisa 8. carmoifin.		17	574 575	Blumen odoratus, wohlriechende Bide. OF. 4-5 guß, niederliegend. 1. weiß 5, ichwarzpurpur mit hallblau	10	2
531	und roth) Jede Farbe à 50 Korn 3 Sgr., 25 Korn 1 Sgr. Dieselben gemischt 500 K. 71/2 Sgr., 100 K. 2 Sgr.		124		2. roth mit weiß 6. ichwarzburput mit genomu. 3. roth geftreift 7. schwarzbraun gestreift.	1	
532	Rosen (Andrieux)- Balsaminen Großblumig bichtgefüllt.	•	481 481 481	576	4. bunfelroth Sede Farbe à Lth. 1% Sar., à Br. 1 Sgr. Diefelben gemijcht à Pid. 12% Sgr. odoratus Invincible scarlet. Neu. Fenrigicar.	1	001
	1. bunkelblau 5. tila 2. rein weiß 6. weiß mit rofa Schein 3. granatroth 7. blaggelb 4. apfelbluthen 8. canvois.		484	577 578 579	Laurus nobilis. h.T. Der echte Lorbeer Lavatera trimestris. OF. 5-6 Ft., rosenroth	2	1 1 1 1
533	Sebe Farbe à 50 Korn 4 Sgr., 25 Korn 13 Sgr. Dieselben gemischt 500 K. 10 Sgr. 100 K. 21 Sgr.		485	580 581	fl. albo, weiß  Leptosiphon androsaceus. *OF. 1½—1 & j., roja uni	3	i
534	Camellien-Balfaminen. (Andr.). punttirte Rosen-, großblumig, dichtgefüllt. 1. scharlach mit weiß 4. rose mit weiß	-	460	582 583 584	hybridus. Reu, in prächtigen Runnen Lilium auratum. 24 T Die iconfie unter ben Lilium	. 15	2
	2. violet mit weiß 5. catimitely in the local actimitely in the weiß 6. illa mit weiß 6. 22 Korn 14 Sgr		490	585 586	lancifolium (speciosum) 4 F. u. T. Befannt Brachtlilie für Land. und Lopffultur giganteum, Riefenlilie. 8—10 Kb. 4T. 50 Kor	n	25
535 536	Masiinta Omera Rolfominen	1	492	587 588	Martagon, Türfenbund. 4F meiß m. gell		1
1	1. pfirsichblüthen 5. purpur 2. weiß mit violet 6. weiß mit scharlach 3. bunkelblau 7. seischichten		69	589 590	Grund Linaria bipartita: OF. 1—11/8 F., in prächtigen Farb	en 5	1 1 1
537	3ebe Farbe à 100 Korn 4 Sgr., 25 Korn 11 Sgr.	DON	495	591	prächtig violet-purpur	i 4	2
538	Burpurroth, 5-6 Bb. boch, febr geeignet & Berbedung uniconer Jaune n. j. w. Berlangt jo	ur n=	2	593 594 593	Großblumia, 1-2 Jus, icon	Buch	4 2
539	nige Standorte	r=	2	59	Linum grandiflorum rubrum. Cr. 12-2 8up 48. fendrend, bunfelcarminroth		
54	wiolet		2	59	perenne, petrili. 2 - 5 Grand Perennirender Lein		1
54 54	Jellblau.  Ipomoea coccinea, icarlacht. Trichterwinde SOF	Т.	4 1	1000	100 Korn 2% &	r	1
54 54 54	atroviolacea, bunfelpiolet, weiß umfaumt	:	4 1	% 60 % 60	fl. roseo, rojajarven	xn o'	
54 54 54	7 grandiflora, großbl. heltotau	nd.		度 60 60 60	of " " " totanfin dunkelblau, m. rein weißem Au	ge.	
55	Mene rietige Schingpfange.  lanchosperma. Reu. §24TF.  Learii \$2LTF. Robl die iconfte ber ausdauer	n=	116	60	fulgens, 1½—2 Fuß, brennend indartau. 417- gracilis erecta. *OTF	u.	6
55	2 , limbata. Horn mit prachtigen Stanten. 2 murpurroth mit beltem Rande.	187	5	60 1 61 13 61	Dindleyana, rolatarben heterophylla major, großblumig dunfelblau		
5.	net zur schnellen Befleidung von Banden 2c.	ig=	4.14	61 61	12 "fl. albo, rein weiß trigonicaulis, niedrig himmelblau 4TF trigonicaulis, niedrig himmelblau 4TF Lopezia coronata. OTF. Schön, 2 Hb. hoch, rot	7	1
1	2. weiß m. rojafarb. Schlund 6. bunkelblau 3. weiß m. violett. Streifen 7. prachtvoll carminr		H DI		Blubt bis zum Eintritt der Froste ununterbroch	cirt	
5	3ede Farbe à Lth. 4 Sgr., à Prise 1 Sgr. Dieselben gemischt à Lth. 2 Sgr., à Pr. 1 &	gr.	Hill		16 Lotus Jacobaeus. 217.	• •	. 1

	lygonum orientals	Loth	Pr.	R	- 76	Loth	
618	Luffa, fiche Cucurbitaceen Seite 9.	0	TOTAL STREET	686	Monarda dydima, 4F. icarladrothe, virginische wohlriechende Melisse. 3-4 85, 4F.	Sgr	Sgr
619	" albo-coccineus, acen norganich	3	1	687	wohlriechende Meliffe. 3-4 &f. 4F		2
620 621	Hartwegii 11/ 9 35 bloom, buntelblau	1 3	1	688			5
622 623	n n coelestinus himmelblau	3	1		himmelblau, für Frühlingsgruppen	10	114
624	, fl. roseo, rojafarb.	3	1 1	689		8	11/2
625				691	Nemesia floribunda, reichblumig. OF. 1-11/2 85. h.,		3
	Nicht mit albo coccineus zu verwechseln, von welcher sie ganglich verschieben.			692	versicolor, buntfarbig		1
626	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	21/2	5	693	, compacta alba, niedrig weiß		11
627 628	" nigrescens, neue, sehr dunfte Sorte	3 21/2	1 1	695 696		:	1
629 630	" MOTIEZIANIS, OHNTEINIAH	21/2	1		Buntten	2%	1
631	mutabilis, wohlriechend nanus, 3merg., 1-14 guß	21/2	i	697		3	1
632 633	" subcarnosus, blau mit weiß, röthlich punftirt	3	1	699	, discoldails, puntelpurpur mit methem Gaum	2½	1
634	nur 1-1 Ff. hoch	10	1	700		2½ 3	1
635		4	1	701	, marmorata, ichwarzbr., weiß marmorier und gerandert		,
636 637	fulgens, leuchtendroth, 4OFT. 2-24 38. grandiflora gigantea. Neu. Zweimal fo grobe		2½	702	n n Vittata, buntelichmarabraun mit breitem mei-	3	1
	50 Porn 4 Gar		08	703	, insignis, himmelblau, im Grunde meis Rfund	2½	1
638 639	" Haageana hybrida, glangend purpur nuaneirt	P	25	704	alba, meiß	1	
640	Lythrum roseum superbum, practig rejenreth 4 big		3	705 706	" maculata, weiß, blau gefledt, großbl. Bf. 121 Sgr. " grandiflora. Reu. Gin Samling von ber be-	1 1/2	11.
641	Macheranthera tanacetifolia 24OTF.	20	1½	70	tannien N. maculata mit Blumen melche		
642 643	, glabra	2	4	707	ben Umfang eines Kronenthalers erreichen " purpurea, geft. purpurroth. Ren und gang		21/2
644	Malope grandistora. OF. Burpurroth	21/2	1	708	Nicandra physaloides, OHT. 5-6 88. h., heliblau .	4 4	1
	Beliebte Bierpflangen, febr geeignet gur Befletbung von Rofenftammen, niebrigen Baunen u. f. w.			709	violacea, biolet	4	1
645	Strauch bon 3-3% Run Sobe. Er brachte feine		3	70	Blattpflange. Der Stamm Dient zur Unter-		45
	Iconen Blutben, melde denen der Malone grandi-	M		711	lage bei Beredelung ber Berunten glutinosa . Tr. Coon. 7-8 Ff. bobe Gruppen-	6	1
	flora abnlich find, im falten Saufe mabrend bes Binters.		18	712	and Cingerplanige	6	1
646	, crispa, GF. 3-9 Ff. Zierpflanze mit am Rante wellensormig franjen Blättern	2	1		" grandistora purpurea. Neu. Eine fehr effectvolle Deforationspflanze mit schönen tiefrothen	9.	
647	" lateritia. Neu. Kriechende niedliche perennirende Species für Felspartieen, Eopfe und Umpeln.		18	713	Nierembergia gracilis, (calycina, filicaulis.) h TF.	4	1
648	50 Korn 3 Sgr.			714	Heherand reichhluhend blantide mais	T. 1	4
649	Martynia lutea. OTF. Brachtig gubgelb, roth punf- tirt und geftreift		1	715	Nigella damascena fl. pl., gefüllter niebenger Garten- Schwarzfümmel. OF. , hispanica, 1 Th., großblum, ichon blau	3	1
650		6	1	716 717	n n alon, incipatitycho	4	1
651	Matricaria capansis d pl 2100	6	1		" atropurpurea." Neu. Nebertrifff alle bis jest ful- tivirten Urten und Barietaten biejes Genus	1	
652	" eximia. 1%-2 & rein mein gefüllt	6	1 1	1	durch die Größe und Schönheit ber tiefblauen nnd bunfelpurbur gefronten Blumen	8	1
694	Maurandia Barcleyana, violetblau. §24 OTF, alba, rein weiß Laceyana, rothblühenb	. 8	2 4	718	" Fontanesiana. Reu. Bon denfeiben Eigenichaften und berfeiben Ruftur ber geschätten N.	0	1
655	, purpurea grandiflora. Wurnurroth grothl. fein	·	2½ 3	1	allopur. Diele neuene gartefat nat noch	T P	
	Die Maurandien gehören ju ben prachtvollften Schlingpflangen, melde fich vorzuglich gur Beflei-	1 12		740	ben Borzug, zwei Monate früher zu blüben, als bie genannte Species	T ev	3
	bung bon Rojenstammen und zierlichem Gitter-			719		2	
667	werfe eignen. Mesembryanthemum crystallinum, Giefraut. OTF.	5	1	720	himmelblau Nycterinia capensis., 2 O T. Berbreitet Abends ben fölftlichien Banillegeruch	3	1
	Mimosa nudica domini		1 1		" selaginoides, gierliche " fl. albo, rein weiß. Neu u. besenders schon		21/2
	Intereffant megen ihrer Etgenthumlichteit, Die			722 723	Ocymum Basilicum bullatum. OTF. Allgemein beliebt	. 47	2
670	hubichen gefieberten Blatter bei Berührung ichnell gu fenfen.			Carlot I	Oenothera acaulie 21 OTE Pit graffer mile 21	7½	1
1000	Minulus cardinalis icarlachrothe Gantlerbl, 4OTF.	964	1	725	n Distorta Veitchiana. (1) The house golf mit	1 61	2
671	cen, bon niedrigem, gedrungenen Ruchie			726	- coccines 1 % practice backyair		1
672	" cupreus, L Th. hoch, glangend, fupferscharlachroth .	123	3	727 728	" fruticosa, ftrauchart. 24 F. 2-3 Kk. fchon gelb.		1
674	" moschatus * bifambuftend. Befannte und ihres			729	n Drummondii. OF. 1-118 &, großbl, gelb. fruticosa, straudart. 44 F. 2-3 86, sidon gelb. Lamarckii. OFT. 3 38, überauf reichblü- bend, großblumig, seuchtend gelb	101	1%
675	", quinquevulnerus * in prächt. Barietäten	100	2	730	" missouriensis (macrocarpa). 4 F 1. 1 %., lebr	981	1
676		634		731	Orobus lathyroides. 21 F. Sehr reightingens him	6	2
1	Die vor einigen Jahren in ben Sanbel gefom- menen prachtigen Barietaten von M. pardinus er-	488		104	Oxalis rosea, rosenrother Sauerffee MTR 1 35	BRE	2
211		068	2	734		787	
681 I	Mirabilis Jalappa, 4OTF, 10 Karben.	128	181		tropaeoloides. *T. Riederliegend. Die roth- braunen Blätter bringen einen sehr guten	E C	
682	aeichnen sich durch viel langere Slüttenbauer auß. Kommen konftant auß Samen. 100 Korn 5 Sgr. Mrabilis Jalappa, 4OTF. 10 Barben. 3che a Ltb. 4 Sgr., a Br. 1 Sgr. Diefelben gemischt.	888		735	Paeonia sinensis (edulis, albiff.), dinef. Baonie. 2 F.	ler.	1%
683	" longistora, langblüthig, violet	1			Papaver bracteatum. 21 F 2-3 St leuchten Sunfal	3 2	3
1	Diefelben gemitht 2 longistora, langbliithig, violet  alan, aba, weiß 3 lomordica, siehe Cucurbitaceen Geite 9.	109		739	murselli fi. pl G. 2 Fuß, gefüllt, weiß, prächtig	18 11	
	and the state of t	1	1	1 8	roth gesprenkelt		

	_	-	- 1	8 -	19at	gr.
m 1		eoth !	Pr.   Sgr.	No	Eott Sgr.	Sgr.
Ta	Papaver Murselli	Sgr.	1	796	Polygonum orientale pumilum, niebrig	1
740 741	Papaver Murselli  " fl. lilacino pl. Gef. lila, roth gesprenkelt .  " splendens fl. pl. Leuchtend rosa mit weiß,	4	1	797 798	Portulaca alba, rein weiger potititut.	1 1
742	partitello ganunfelmohn in vielen	4	1	799	striata, gologelb geftreift	1
Topic and the last	somniferum fl. pl., extra gefüllter Gebermohn in	100	0007	801 802	Polygonum orientale pumilum, niedrig Portulaca alba, rein weißer Portulaca alba, rein weißer Portulac. (FT. aurea, goldyelb geftreift aryophylloides, ichon geftreift. Gillesii, carwoijiurofd. (Gillesii, carwoijiurofd.) (Gillesii, carwoijiurofd.) (Gillesii, carwoijiurofd. (Gillesii, carwoijiurofd.) (Gillesii) (Gillesii, carwoijiurofd.) (Gillesii) (Gil	1
743	10 practigen Sotten,	3 2	1 1	803	grandiflora fl. pl. OTF. ger, gortnationelle. Diese Büchtung gebort ju ben iconfbarften Be- reicherungen ber Garten. Brillantes, glubendes reicherungen ber Sarten.	620
743a	Diejelben gemilat prachtigen	4	1			
744	Sorten, jede	21/2	i	2	Muancirungen bertreten. Liefer fich als conftant.	020
745	gef. Zwerg Baontenmonn, weiß mit tuplet	6	1	L	1. alba, 1. splendens, 3. rosea, 4. Thermassur, 100 Rorn 2 Egr.	627
747	Passiflora coerulea. § 41. Set. white Suffings in the	8	5	1	5. aurea, 6. caryophylloides, jede garbe a 30 Koth	622
748	Reizend für Reintattete und antwickelt eine	-	169	803a	Melange I. Qual. 100 K. 2 Sgr.   Rur von fünftlich 1000 " 15 "   befruchteten Blumen	633
1	Ungabl ichoner, lebbaft gelber Blutgentobigen.	-	693	1	Die Port. bluben am iconiten in magerem Bo-	600
749	Pentastemon acuminatus (Donglas). 4TF. Schöne Barietat, wird 1—11/8. hoch, mit langen auf-		707	1	ban und ber nollen Sonne allogelest.	1
	rechtstehenden vielsettigen Erauben bon bidutty		5	804	Potentilla alba. 24 atrosanguiuea, bunfelroth. 2 8. 2 F.	5 1
750	purpurnen Blüthen. Reu barbatus Torreyi (Gray). Diese Bflange ift mere- barbatus Torreyi ihrek fräftigen Wuchfes, wird	1	107	806 807	Hopwoodiana, grobbitants . Corten	. 2
	bie 7 36 h und blübt icon icarlach. Reu .		5	808	hybrida, Melange Plantiget Of F. non engl Bracht.	. 6
751 752	" digitalis. 4 F. Die blaublübende Section	1	7.05	811	chinancie dinei Brimel & T	3 4
	Diejes Genus enthatt weitt ichan blau, ber Schlund		5	812	alba, weiß alba rubra striata, rothgeftreift	. 4
759	ichon lila. Die Planze jeibit ift bottommen gate.		1074	814 815	cupreata, fupfer-carminrold (Benary). Reu.	\$40
753	Blumen ifla-purpur pubescens, 11/2 &., blaul. purpur, reichblubend	6	1 2	51.	Diese neue reizende Battetut etfactut bila piolet	159
754	Blumen illa-purpur pubescens, 11/—2 &, blaul. purpur, reichblubend Wrightii. 15/—2 &, bunfelrofa mit weiß. Pelargonium hybridum grandisorum. h.T. Bor Pelargonium hybridum grandisorum. h.T. Bor	Nic	710	01/	rein weiß umranbet 50 Rorn 2 Sgr.	1 410
756	neueften belgijden und englischen Brachtsorten		6	816	7 " erecta siperva großblumig roth 50 Korn 3 Sgr.	
757	neuesten belgischen und englischen Ptachteten gesammelt.  Fancy, reichblübend.  Odier, prachtvoll sünsstedig.  zonale, Scharlach-B. in schönen Farben. Perilla nankinensis. OTF. Blattvslauze mit dunkel rothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen		6	81		
758 759	" zonale, Scharlach B. in schonen Farben	: .	3	811	" " " kermesina splendens, carminroth	119
760			1	82	arosto superha gem, großbl., aufrecht.	140
761	Petunia nybrida. 2011. Sanges gejam.	. 12	2 2	82	50 Porn 74 Sar.	112
762 763	" " Countess of Affennet fich porgualich gur Beflei	8	213	82	Diese Barietat zeichnet fich butch teutige, tunge	E BEG
	bung von Rubeln 20.	n	2	2	fehlenden, gedrangten Blumen find gefranzt, intensiv	· P
765 766	" " fleinblumige, mit gestetten blumig carmoifir	t a	2	11	purpur carmin mit großem, funffeetigen, tergafe	a g
767	roth		. 4	82		E 1
768 769	" " II. pl., gefatte, the 11/2 Se schön blau.		3 1	Jie.	garben. 1. vennges in	: 10
770	tanacetifolia, rainfarnolatting 2 35 ichon	1	8 1			. 10
772		ie o	i lu	8:	Pyrethrum rosenm n. pl. die die 24 f. Flor- Banunculus asiaticus superbissimus. 24 F.T. Flor- blume ersten Ranges. Als eine zweijährige Pflanze zu fultiviren, und fast nur bicktgefüllte Blumen in	
	Bon unserem prachtrollen Gortimente gef.	F.	083			LE 10
774	Drummondii, Drummond & Fattimenotame. O-	. 1		13/2	Juli bis September magtenden Fibt bitolik Graffe ber	16 18
77	oculata, weis utte vagancen	ngo	1 100	2	Gartenranuntel darin, daß fie auch mahrend bes beifeften, trodenften Wetters ohne Aufboren blübt. 50 Korn 3 Ggr.	
77	stellata, weigestellte Ruancen .	eno	. 19	2 8	- Wastried Roleta OF Red. 25 Gar.	1½
77 78	o coccinea, rein feuerfatben				30 grandiflora, großbluttig. Robbitet uto bie gelegnet.	1½
78 78	1 sabellina. Rein geibe Suttettt	1.		2	7 the atresenguines hurburgarmoifingoth OTF.	
78 78	3 Princesse Royal, Illa, weiß getteett		. 13		maculata, geffect. Stuffen groß, tolubaten	
78	Wilhelm I., prachtou buntettott, uch 3	on	30	0 0	farbenen Ring unigeben ift	15
78	Tr. 2-3 &., fcarladri	oth	0 18		" Manglesii Sammtlich reigende Immortellen. Schone Rhododendron arboreum hybridum. h.T. Schone	10
78	principle . Om F fallow	Sec. 1	0 12		Rhododendron arboreum hybridum. h.T. Schone Sorten gemischt	
78					a brbridum hTF Morangime Sprien	
79	Polycolymna Stuarti. OTF., schone Immorte	lle,	8		gemischt. Sart wie ponticum. gemischt. Sart wie ponticum. ponticum in vielen Farben gemischt von Bhotan Jenkinsi h.T. Gine prachty. Species von Bhotan	12½
7	Polemonium coeruleum, blaublühendes Sperrfra	Hit on	2	1	mit bis 5 3011 langen, 2 3011 vietten, teintoerpen,	. 1
	1. albo, well in manufroth gegbert	esqu	19.	21/2	Ricinus africanus hybridus, afritanischer Bunber- baum. OTFW. Reue Barietat mit rosafar-	16
	Polygala myrtifolia. OF. 4-5 Fuß hohe ich	one	3	1	benem Stengel	7%
(1	95 Polygonum orientale. Gruppenpflanze					

N	Harris	Lot			Weston.	0-16	
84	Ricinus borboniensis arboreus	Sgr.	Sgt	Ua -	Statice sinuate (45. cr	Sgr.	Pr.
842	bentliche Größe.	3	100	88	Thouini, 4 F.	6	1
014	tianee, großblumig, icon hochrofa, im Schlunde goldgelb			88	Stevia Eupatoria, 4 TF.	6 15	11/2
843			5	89		277	1½
844 845	Salvia argentea, filbermeiße Salvie 14-2 Sub JE	10 12½	1 1 2	89	Bor bunft, Gehölenartigen nan fahr mancirungen.	5	1
	haarige Burgelblatter fic außerft portheilhaft nom	*	100	89	Raugusthlume Leuchtenb gologelb, jehr ichone	w.	1
846	" coccinea, jcarladr., 2-3 gus b. borr.		2	89	signata numila * TE 1 C	4	1 1
847	" punicea nana, granatroth. S., 1/2 Fuß hoch, fehr		2	894a 893	n , fl. pl., gefüllt, sehr niedlich	5	1
848 849	Sanvitalia procumbens. * FT. Magemein helieht		1	896	braunem Grunde Golbgelb mit ichwarz-		1
850	zu Einfaffungen zc., goldgelb mit schwarzrother Scheibe, den ganzen Sommer hindurch blubenb . procumbens fl pl	8	1	898	alata il. albo, weiß mit ichwarzviolettem Grunde	:	1½
	Blumen von bichtefter Fullung. Die Sany, einnen fich porgratich fur ber		3	899 900	Barckerii, reinmefü	177	1½ 1½
851	Saponaria multiflore *OPT 1 Cut Vite for			901	Thladiantha dublella	8.6	1
852	roth, reich und lange blubend , multiflora alba, neu und schön , marginata, neu, sleischfarben .	4	1 1	902	curbitaces § 2 TF 10 Korn 3 Sgr.  Trachymene coerulea, blaue Trachymene. OTFW.		
853 854	South of all opur purea. Immorrhurning minh of cahinia	3	1.	903 904	The Cucurottaceen College		1
855	atropurpurea nana, niedrig, 2 fuß. Prächtige	5	1	905	Dochrantend, fcon belaubt und fehr reich blubend , Lobbianum. Bort. Mehrere fcone Farben		2
856	" " " fl. Dieje icone Neuheit ift eine bedeutende Berbefferung ber befannten Scabiosa pana mit	5	1	906	, Brillant, brennend icarlach, großblumia		2 1½
	röbrten Pompon-Chrysanthemum Der Muche	ring.	810	907	rothen Fleden		2
857	Schizanthus Grahamii, Graham's Snatthlume OTE		25	909 910	, Kotschianum multiflorum, icharlach, fleinblum.	:	15/2
858 859	grandiflorus oculatus. Briffant hurburroth	8	1 1		" Kronpring von Preußen. Die Pflanze über- bedt sich mit Blüthen, die durch ihre bril- lante Farbe alle Trop. überstrahlen.		
860	, albus. Ein Sämling von grandft. oculatus. Große weiße Blumen mit schwefelgelbem Auge atropurpureus. Reu. Ein anderer Sämling		1	911	" Lili Smith, bellicarlach 15 Korn 5 Sgr.		2
	purcarminrothe Plume mit ichmarrem Muse	118	11/	912	" , Napoleon III., gelb mit blutbraunen Fleden,		25
861 862	fl. albo, meifhliß mit gologelb und purpur	8	1 1	913	rothen Rieden weißlich gelb mit icharlach-	4	3
863	11/2 % b. meiß mahlrieden OTE		1	915 916	" majus, große Capuginerfreffe. § DTF. " Eduard Otto, ilia mit Atlasglanz " Regelianum, prächtig purpurviolet	2	1
864	4-5 Kuß boch. Die schän gelben Blemen in	100	0.0	917	" Scheuermanni coccinea, ftrohgelb, hellicharlach gestreift und marmorirt		1
865 866	sedum Aizoon, icon. 24F.  coeruleum. *OTF. 4-6 30fl, reichblübenb. Eins ber iconten Sommergemächte für Kintaffungen.	115	2½ 1	918	minus Tom Thumb. Crystal Palace Gem. hoTF. Strongelb, roth und braun marmorirt		1 1 1
3	Miniaturtonfe ac	100	60	919	" " " Beauty, gelb, idarlad gestammt	IN I	1 2
867	Bortrefflich gur bichten Befleidung trodner		1	921	" " " King of Tom Thumb, scharlach mit buntler Belaubung . " " King Theodore, mit schwarzrothen Blumen	10	2
868	Senecio elegans fl. pl., gefülltes Kreuzfraut OFT	int.	1026	923			1½
3	1. weiß 4. fupferroth	- 16		17	natrococoineum, dunkelscharlach		2½
9	3. bioletroth 6. ajchbraun Sebe Farbe à Pr. 11/2 Sgr.	in a	180		Buide und find benen besonders gu em- pfehlen, welche feine Saufer gur llebermin-	3 0	
869 870	Biele garben gemiicht 1/2 Etb. 4 Sgr. Senecio elegan nana fl. pl., gefülltes niedriges Rreug-		165	T	Die Formen von T. Lobbianum und	E E	
1	1. weiß 4. himmelblau		035 035	1	Topfkultur, indem fie im temperirten Saufe	18	
100	2. tief rosa 5. purpurroth 3. carminroth 6. violet		500	924 925	Verbascum phoeniceum 2 F		
871 872	Sebe Karbe à Br. 2½ Sgr. Biele Farben gemijcht 1/5 Lth. 6 Sgr. Silene Armeria, Morgenröschen. • F. 1—2 Hh., leuch- tenb rofb .			926 927	Verbena Aubletia, Od TF. 2 Fuß hoch .  Drummondii, OTF. 1½ F.  hybrida hOTF. Won neuen großblumigen Barie- täten geinnmelt	1	
873	tend roth		1	928	novolto italianista. Surist	2 5	
874 875 876	** Theria, Morgenroschen. © F. 1—2 Ff., leuch- tenb roth		1 1 1 1	929 930 931	Vicia Gerardii, S F. Men. 4-5 & practice minter	1 1	
	, pendula, schön rosenfarben . 2 , fl. albo, weißblübenb . 2 striata, 2 guß, schön	16	1 1	932	, tricolor maxima, Od FT. Biele Farben gemifcht,	1	8
879	olanum Capsicastrum, Beitheer-Machtichatten hTE		1	933 934	nur von prächtigen Blumen gesammelt 31 " , aurikelfarbene	2 2 2	8
	1-2 fuß boch, mit zahlreichen, icarlach orange farbigen Früchten	1	2	935 936	n , aurifelfarbene . n , in braunrothen Nüancen . n , weiße Nüancen . n , hellblaue Nüancen . n , marmorata, pröditig marmorist	3	
81	Melongena Giarfrucht in		1	937	a a biol mit meinem Rand	21 21 21 3	Salar
83 9		W 2	200	939 940 941	, , , Dr. Fauft, fobifcwarz . , pelargonienblutbige	3 2	Min I
	henb. 4 F	li		1	bentlichem brillanten Magentaroth (neue Farbe	1	

			20	1	10	2oth	Br.
No		Loth Sgr.	Pr.   Sgr.	Na	4/69		Sgr.
942 943	Viscaria bei den Viscarien). Die schönen hellgrünen Blätter kontrastitren effektivolt mit den zahlreichen Blumen oculata, Lichtröschen. 2-2 Buß boch oculata hybrida, niedr. reichblühend Wahlenbergia grandistora. 4-5 F.  " alda Bekannte schöne Campanulaceen. Waitzia acuminata, OTF. Schöne, 1-11/2 Guß hohe Immortelle	15 5	2 1 1 2 3 3	998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005	Sorghum glycichilum, hinestische Juderhirse. OFT. 4—5 Huß hoch saccharatum, italienische Juderh. Stipa elegantissima, A FT. 3 Kuß hoch gigantea, 4 Kuß hoch gennata, Kebengtas. 3 Kg. h. Sehr belieht wegen pennata, Kebengtas. 3 Kg. h. Sehr belieht wegen jeiner iederartigen, sußlangen Grannen Tricholaena rosea, rosenrother Haarlenuch, AOTF. Uniola latifolia, Spitzgras. A FT. 13—12 Kuß hoch Tea Caragua, Riesen-Nais. OFT. 12—15 Kuß hoch Cuzko, der höchte und größen Mais für Defora- tion. Mit sehr beeiten Blättern, gedrungenen	dae dae dae	6 1 1 1 1
947	Steeziana (Benbland). *Nen. Eine jebr intereffante Species für Miniaturtövfe; wird ungefäbr 6" hoch, mit einer Dolbentraube von gelben Blu- men, beren jebe 1½" Durchmesser bat Whitlavia gloxinioides. OTF. Nen Eine sebr elegante	lait	3	1006	paponica fol. variegatis. Gine practicel Neu- beit, welche nirgends fehlen sollte. Dieser Mais beit, welche nirgends fehlen sollte. Dieser Mais	10	5
949 950 951	flora mit einer Menge tein beget in beget geränderter, ben Gloxinien abnlichen Blumen grandiflora, OF. 11/2 Suß hoch, blau alba, weiß hTF. Eine ber effettvollsten Wigandia caracasana http://documents.com/documents/	4	3 1 1 1½	- 10	erreicht eine 306e ont 458. lang, icon gleichmäßig 2-3 30ell breit und ca. 4 88. lang, icon gleichmäßig gestreift und bandirt.	3	1
952 953	Xeranthemum annum fl. albo pl., weißgefülltblu- bend. OF T. 2-3 Huß boch bei bichtgefüllten caryophylloides pl. Reu. Die bichtgefüllten	5 100	1	1000	1. Kruchtgehölz-Samen.	Bfi Di 2	und Sgr 10
954 955	geftreift, geftricett, geftrie and geftreift, geftrie gefte bef bef Portulaca caryophylloides ber half ift. Bariirt noch . ft. purpureo pl., purpurrothgef	6	1 1 1 1	1008 1009 1010 1011 1012 1013	Juglans regia, Addunds Morus alba, weiße Maulbeere fructu nigro. jchwarze M	1	25 5
956 957 958 959 960 961	n. aloo, weige n. atroviolaceo, bunfelviolet n. aureo, goldgelb n. coccineo, idarladrotb n. sulphureo, idmefelgelb n. sulphureo, idmefelgelb n. pleno, gefullt in pradtigen Farben	10	1 1 1 1 1 2 2	1014 1015 1016 1017 1018	Pirus communis, Birnfern	1 stato	5 2 20
962 963 964 965	coccinea fi. pl., geflute lighthaufter  " kermesina fi. pl., gef. carnoffirroth  " violacea fi. pl., gef. violet		2 2 2 1 1 1 1	100	2. Ziergehölz-Samen. Die Gehölziamen, welche befanntlich ihre Keimfraft ichmeller als die meisten anderen Samen verlieren, bitten wir bis späteftens Ende März aufzugeben, da um diese Zeit alle noch verhandenen Vorräthe in		
966 967 968	Agrostis nebulosa. FT. 1-2 yr. 5000, 10001 pulchella, şierlices 1-1 xr. 1xr. 1xr. 1xr. 1xr. 1xr. 1xr. 1xr.	ie 6	1		a. Coniferen.	Bf1 Sgi	b. Et
969 970 971 972 973	Briza maxima, größtes Zittergras. F. 2 H. hoch minima, fleinstes Z. 1 H. hoch Brizopyrum sicalum, Zitterährden. Fr. 2% F. Brownis brizaeformis. Fr. 2 Fuß h., schönes Bor	ь. б.	1 1 1	101 102 102 102	7.12	) cutos	10
974 975 976 977	chloris polydactyla, 1 Hb. hoch. *OTF. submutica, 14—2 Hb. boch. Chrysurus cynosuroides, Woblimana, 2 Hb. OF Coix Lacrimae, Sibbstfrane. OFT. 2 Hug boch.	T. 8	3 1 3 1 3 1 3 3	102	funebris Endl	4	-
978 979 980 981	Eleusine coracana, frummähriges Kreuzgras. OF	T.	5 1 4 1 5 1	103 103	", virginiana L. (aus America importirt)	: 10	)
98 98 98	2 2 gug down. F. 24 Gug hoch. Eines t empfehenswertheften Ziergrafer	oer · · · em	4	1 10: 1 10: 1 10: 1 10: 2 10:	balsamea L	· At	5
98 98 98	5 Festuca altissima. 4 F. Soll bis 12 Ff. b. werd	ien i	6	2 10 1 10 10 1 10	maritima Ait. Nordmanniana Stev.  vorientalis L.  Picea L (Ab. pectinata DC.)  a Bort. 2 © g	gr.	5
98	Gynerium argenteum, Pampasgras. 4 TF. Eine größten Zierben ber Gärten. Die 4-6 Fb. bot Gtengel tragen präcktige filberglanzende Aehr	der hen ren rF.		10 10	3 Strobus L. 10 Nüffe 4 S 44 Salisburia adiantifolia Sm 10 Nüffe 4 S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	gr.	
99 99	100 Lagurus ovatus, efformiges Summerstrained in Molinia coerulea fol. var. 4 FT. 2 Suß hoch 2 Panicum orycinum. 4 TFw. 2-3 Suß, icon	i i	6	1 10 1 10 2 10 10	distichum, Kich.	r. 40	0
99	plicatum, ichon belaubt  sulcatum, mit breiten dem Curculigo ähnlid  Blättern, fehr decorativ  Diese dreit Panicum verlangen einen warn Standbort und Feuchtigfeit.  Paspalum elegans, zierlich. A TFW.  Pennisetum longistylum. • TF.  Setaria macrochaeta. • TF. 2 H. h., schöne Grupp	nen		2 10 10 1 10 1 10 1 10	Thuja gigantea Nutt.  occidentalis L.  orientalis L.  orientalis L.  orientalis L.  orientalis L.  var. aurea (Th. aurea) 25 Rorn 5 @gr  plicata Don (Warreana)  Wellingtonia gigantea, Lindl.  10 Rorn 6 @gr	r. 4	0

M	numberella to release, but Detidouer Bende	Pfb.	Leth	.   18m	Horner us manifered Milenes married and married	1 PFb	R+R.
mi011	b. Neue und feltene japanische	Sgr.	Sgx	aurice.	these Middings field to most bourt our fire	Sgr	Sgr
Sent 1	o. Mene und lettene labautlide			1114	Cytisus Laburnum L	10	-
14295711	Coniferen.			1115	nigricans I.	10	5
1000	(gang frifder Samen.)			1116	Diospyros virginiana L.	100	2
1056	Ahies acicularia Marina 100 6 1 000 10 0 7 000			1117	Elaeaghus angustiloha	1	21/2
1057	", bicolor Maxim 100 %. 1 2011. 10 %. 5 Ggt.			11119	Fraxinus excelsior L., cinerea Bosc.	2	Mil.
1058	, Tsuga S. Z 100 , 20 Ggr. 10 , 2% "			1120	- Ornus L.	90	2
1059	, bicolor Maxim			1121		101	32
1061	Pinus koraiensis S. Z 2 , 8 , obovata			1122	- triacanthos (4rth	10	1
1062 1063	Retinospora pisifera S. Z. 100 , 1/3 , 25 , 3 ,			1123	drycine chinensis Sims 20 Porn 15 Gar		
1064	Sciadopitys verticillata			1125	Gymnocladus canadensis Lam. Halesia tetraptera L.		7%
1065	Taxus cuspidata S. Z 100 , 2 , 5 , 8			1126	mioiscus syriacus L., fl. pl.		5
				1127	nea Aquitottum walt.	15	1
	c. Laubhölzer.			1128	, , ioi. aur. varieg., goldbuntblattrig		3
1066	The state of the s	40		1129	fol. argent. varieg., filberbuntblattrig	-0	3
1067	Acer campestre L	10	2001	1131	Indigofera Dosua Ham.  Jasminum fruticans		8
1068	" Pseudoplatanus L.	3		1132	Juglans cinerea L 25 Muffe 10 Sgr.		2%
1069	, Negundo L	12	1	1133	nigra I. 95 90 Ha e Can		
1070	, rubrum Lam., echt	75	4	1134	Kalmia latifolia L		
1071	, saccharinum	25	1	1135	Ligustrum japonicum Thnb	10	1
1072 1073	tataricum L	45	2	1136	" syringaeflorum		5
10.0	Samen)	12	10	1138	Magnolia grandifiora L.	12	1
1074	Alnus glutinosa Gaert.	6	1.70	1139	" macrophylla Mx 25 Rorn 7% Ggr.	reiff er	3
1075	, , laciniata			1140	" Norbertiana Hort 25 " 10 "		
1076	, quercifolia Willd à Bort. 4 Gar.			1141	" Soulangeana Hort. Par 25 . 10		
1077 1078	Amorpha fruticosa L	25	13	1142	Yulan Desf		
1079	Azalea pontica I.	1111	50 12	1144	, umbrella Lam. (tripetala)	10	3
1080	Benthamia fragifera Lindl. Berberganadensis Willd.		5	1145	Bealii Hort	40	2
1081	Berberis canadensis Willd	25	13	1146	Mella Azedarach L.	8	11/
1082	" Toltunel			1147	radiownia imperialis S. Z		2
1083	, vulgaris fol. atropurpureis Hort		8	1148	Periploca graeca L à Bort. 3 Sgr.		
1084	Betula alba L	- 3		1149	Philadelphus coronarius L. fl. pl. a \$501. 3 \$91. 3		6
1085	, nigra L	0.8	10	1151	grandiflorus Lindl	A Is	12
1086	odorata Bechst.	10	1	1152	Platanus occidentalis Hort (vulgaris)	10	1
1087	Bignonia radicans L.		8	1153	Prunus Manaleb L.	15	1
1088	Broussonetia papyrifera Vent.		4	1154	, Padus L	15	1
1090	Calycanthus praecox L	. 4	5	1155 1156	, Laurocerasus L	0.	2
1091	Caragana arborescens Lam.		4	1157	, virginiana D. R. Ptelea trifoliata L.	25 25	11/2
1092	Catalpa syringaefolia Sims.		24	1158	Pterocaria caucasica C. A Mey		1½ 15
1093	Ceanothus azureus L a Bort. 2% Sgr.		12%	1159		30	1%
1094	Celtis australis L		15	1160	Kilds Cotinus L.		4
1095 1096	" occidentalis		2½	1161 1162	, typhina L. Ribes alpinum L.	20	1
1097	, Siliquastrum L.	0. 10	2	1163	Robinia Pseud-Acacia L.	6	4
1098	, afl. albo		3	1164	, Bessoniana Hort., bie neue icone Rugelatagie		10
1099	Clematis cirrhosa L		12	1165	" Decaisneana. Reue fcon rothblubende Barietat	88	
1100 1101	" Viticella L.	0. 40	21/2	1100	Der gemeinen Mazie 25 Korn 5 Gar		
1101	, fl. rubro	20	3 1	1166 1167	Sophora japonica L.	15	1
1103	" cruenta Ait	20	5	1168	, , pendula	6	3
1104	Cornus alba L	60	3	1169	Spiraea callosa Thub.	. 25	5
I105	, mascula B. et L	15	1	1170	" Douglasii Hook	. 108	6
1106	Cretague cogginge I	10	3	1171	" opulifolia		6
1107 1108	Crataegus coccinea L	10	1	1172 1173	Staphylea pinnata L		15
1109	, melanocarpa β monogyna L	25	2	1174	Tilia argentea Desf. , platiphyllos Scop. (grandifolia)		2
1110	, Pyracantha Pers	20	1%	1175	vulgaris Hayne, (europaea)		1
1111	Cytisus alpinus Lam	20	13	1176	Viburnum Lantana L.		1
1112	, capitatus Jacq		5	1177	Vitis (Ampelopsis) hederacea Ehrh	15	1
1113	, elongatus W. et K		5	1178	, Isabellina		7½

#### Grasmischungen für Kasenplätze.

Indem wir nachstehend verschiedene Grassamenmischungen zur Beachtung empsehlen, welche kleinere, wie größere Gärten zu zieren bestimmt sind, glauben wir nicht unterlassen zu dürsen, einige erläuternde Borte, sowohl in Bezug auf die Mischungen selbst, wie auf deren Berwendung hinzuzussussen. Für durchaus günstige Berhältnisse, wie sie der weist in hoher Kultur besindliche Boden der Gärten bietet, genügt es, wenn die Bestellungen nach den gegebenen 5 Rubriten ertheilt werden; anders verhält es sich aber, wenn etwa Umstände besonderer Art in Betracht kommen, welche der Entwicklung eines Theiles der gewöhnlich zu diesem Zwecke benutzten Gräser nicht sörderlich sind. Die Gründe hiersiür werden sich meist leicht erkennen lassen und können dann, wenn wir von deuselben nur eingehend unterrichtet werden, häusig durch eine den Berhältnissen angemessen Abänderung beseitigt werden, trägt nicht gerade übermäßige Dürre, Lässe oder Mangel an Kultur die Schuld; auch bedarf es der Erwähnung, wenn die Seschäfenheit des Bodens, wie eine ranhe Lage das Ausknittern begünstigen sollte. Weisst kan durch Benutzung solchen Eusstlissen unschlieben unsere zur zie leidlich dauernder Kasen erzielt werden, der wohl an Feinheit demjenigen nachsieht, welchen unsere zur Zier beliebtessen Untergräser der alleiniger Benutzung bieten, der aber doch, wenn nan nur nicht versämmt, ihn unwer kurz zu halten, seine etwas gröberen Bestandtheile wenig auffällig erkennen lassen der Nasen genügen soll. Ist

er bestimmt, sander gehaltene Blumenpartieen zu umgeben, und ist er namentlich so gelegen, daß der Beschauer denselber in vertikaler Richtung sieht, so muß, damit der Erdboden nicht durchscheint, die Gräser also den Boden vollständig bedecken, dicht,  $^{3}/_{4}$  bis  $^{1}$  Phund p. — Ruthe, gesäet werden. Jemehr sich die Rasenslächen von dem eigentlichen Ziergarten und dem Auge entfernen, um so mehr psiegt man bis zu einem gewissen Grade das Aussaatquantum zu verringern. Bei den sehr diebergirenden Ausprüchen, welche betresse der Dichtigkeit, namentlich bei bedeutenden Ausgen an dergleicher Rasenslächen gemacht werden, wird es schwer, ein bestimmtes Minimal-Aussaatquantum sestzussellen; indessen bemerken wird doch, daß wir 50 Pfd. p. Magddg. M. sür das geringste Maß halten, will man nicht bei noch geringere Saat zuweilen ein ganzes Jahr warten, ehe die Flächen leidlich gedeckt sind.

Gine Unleitung gur Anlage und Unterhaltung eines bauernden Gartenrafens fteht unferen Abnehmern gu Dienften.

Marie	100 \$10. a \$10.
	Thl. Sgr., Sgr.
1. Rafenmifchung für Barts mit gutem Boben	15 6
1. Rasenmischung fur Parts mit gutem Boden 2. " "beschattete Rasenflächen	15 15 6
3. beigattete Rafenflachen	15 . 15 6
3. Heine Rasenmischung für größere, gut gehaltene Flächen (in Pleasuregrounds 1c.). 5. Gartenrasen von größere Feinheit (für kleinere durch Blumenpartieen 2c. unterbrochene Rasenplätze)	16 . 15 6

### Pflanzen von Blumen und Ziergräfern.

Bur Pflangeit fteben Pflangen von Levfopen, Aftern, Balfaminen und ben meiften anderen Blumen, ebenfo auch von Ziergrafern g Dienften. Der Preis normirt fich, je nach ber Seltenbeit, von 3-15 Ggr. pro Schod.

### Nachtrag,

#### die Neuheiten für das Jahr 1868 und einige andere Samen enthaltend.

Tin	there graces in the property 3 Sans	Lth. Sgr.	Brif Sgr		No		Lth. Sgr.		Bri
	Anastatica hierochuntica, OTF. Rose von Bericho	0,9	5		1202	Centaurea (Amberboa) moschata atropur- purea. OFT. Untericeibet fich von ber bis jest fultivirten Art burch ftart ins Rarmin übergebende,			
180	Antirrhinum majus pumilum quadrico- lor, OFT. Gine ausgezeichnete Zwergsorte, farmoisin mit ich relach, weiß und gelb.		4		1203	tief dunkelrothe Blumen. Wird sehr gerühmt	r lat		10
181	An irrhinum multiflorum.  Durch Befruchtung von A. rupestre mit A. majus entiftanden. Die Blumen sind rosa mit weiß und etwas kleiner als bei A. majus, sie erscheinen so reich, daß die J Ky hohe Phanze ganz davon be-	0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1	10	·	201 A1 A1	hier neue Barietaten mit größtentbeils dichtgefullten Blumen in den verschiebenliene Schattirungen von orange, icarlach, rofa, braunroth ober purpur, welche eine ichone Zierbe unferer Garten zu werben versprechen.	ninal dila		
1182	dedt ift. Cehr hart.  Antirrhinum majus Tom Thumb, leucht. fuchsr.	001	3		1204	Chrysanthemum tricolor annulatum, O febr			2
1183 1184 1185	n n n aurora	lay8	3 3 3		1205	icarladrothen Ring im Centrum Cineraria hybrida var. kermesina (Benary). FT. Rein carmoisinroth, eine conftante und febr werthvolle Bereicherung, namentlich für ben			10
1186 1187 1188 1189	, , , daniels , , , blutroth , , , citronengelb , , , carmoifinroth	drad	3 3 3		1206	Blumenmarft. Clarkia pulchella integripetala alba plena. & TF. Schöne Barietat mit rein weißen, gefülten Blumen, die groß und vollsommen imbri-	100	0	4
1190 1191 1192 1193	, , roja mit weiß. , , gesiectt , , idwefeigelb. , , breifarbig.	la constitution de la constituti	3 3 3 2		1207	quitt sind. Clarkia pulchella marginata fl. pl. GFT Sehr gefüllt mit rundem, schönen weißen Kande ebenso brauchbar für Bouquets wie für Einfassunger			6
1194	gemischt Die vorftebenden Barietäten werden nicht halb io hoch als die alteren Formen des Ant, majus, fie find jedoch viel robuster als jene und blüben sehr reich.	100	2		1208	Collinsia verna. O Diese Art ift sehr elegan burch die frische Farbung ihrer großen Blumen welche halb gart blau und halb rein weiß gefärb sind; sie ist sehr werthvoll durch ihr frühes Bliber jur Ausschmuckung des Gartens im Frühjahr, it		9	
1195	Asclepias tuberosa, 4 F 25 Korn 5 Sgr. Die schönste Species dieses Genus. Blumen leuchtend schaftachroth.	H		h	non	Löpfen oder freiem Grunde. Die Samen muffer febrzeitig im Frubjahr, vortbeilhafter noch im herbit gefaet werben, follen die Pflanzen fich fraftig ent	2		
	Begonia, Reueste Sorten, gegenseitig befruchtet, gem. hw		5	in in	1209 1210	mideln	11 2	4	5
1131	wachsende, icone Batietat bes Bittergrafes, pracht- voll fur Bouquets und andere decorative Zwede im		nii		1011	ausgezeichneten Sortimente gesammelt. 100 Korn 5 Sgr Dianthus barbatus nigricans. 4 F			
1198	Binter Camellia, hT., gefüllte Gorten melirt, italienifche		10	ricini	1211	Unterscheibet sich von den andern Barietaten be Dianthus barbatus wesentlich burch seine schwarz	r	114	U
1199	Samen 10 Korn 5 Sgr. Campanula Medium fl. roseo pl. Jk Dieje fcone Barietat unterscheibet fich von bet beliebten Marien Glodenblume burch bie frifde	15	2	P	1212	violetten Blatter, die Blumen sind glanzend dunkel roth mit weißen Staubfaden. <b>Dianthus dentosus</b> , 4 F. Eine niedrige, früh blüßende ausdauernde Freilandspecies mit zahl	e	100	
	rein rofenrothe Farbe ihrer großen Blumen. Ge ift eine febr zu empfehlende Acquifition, um fo mehr als fie fich durch Samen conftant fortpflangt.				1.00	reichen rosa-lila Blumen, für Einfaffungen seh	r .		5
1200 1201	Campanula soldanellistora pl. 4	The state of the s	4 4		1213	Dianthus Heddewiggi grandiflorus striatu plenus, OFT. Blumen febr groß, dicht gefüll rein weiß, icwach mit sammetartigem Dunkelcar moissin gestreift.	,	100	5

Ro	The state of the s				A.					
- Orti		Sgr		rife	ts I	No	THE THE PERSON AND TH	Pth		rife L Phy
121	Dianthus Heddewiggi lilacinus. OFT. 2118-	7.9			-	1235	Pentastemon, h T, bon ben neueften gang niedrigen	Sgr	og	- 249
	gezeichnet für Ginfaffungen und fleine Gruppen; ift namentlich wegen feiner langbauernben Bluthe-	BDE					Barietaten gesammelt . Pentastemon Colvilli. 4 F. Aus Californien.		2	
	gett fest gu empfesten. Die Blumen find rein lila-	230	10				Su bet wibbe bem r. Jeurevanus abuild, aber mit	1		T
121	farben und fehr effectivell		10				purpurfarbenen halbhangenben Corollen und glan- gend grunen Blattern. Bollfommen bart	A HA	1	707
	Gine neue intereffante Barietat, Die Ranber ber	100	10		1	1237	Pentastemon speciosus. 24 F. Samen hiernon		6	
	Blumenblatter find jurudgeschlagen und geferbt ober gegahnt, ein bunfler Streifen lauft bis jum						in biejem Sahre jum erften Male angeboten. Die Pflange wird 2-24 Jug boch und blubt mit, in breiten			
	Mittelpuntte derselben. Die Blumen find im Ge- genfage zu den andern Eschscholzien immer ge-				-		Rispen ftehenden Blumen bon der iconften, tief buntelblauen garbe. Bolltommen hart	Piso		des
	öffnet, ba fie durch ihren eigenthumlichen Bau ver-				1	238	rardanthus (Moraea) sinensis, 21 F	:	6 3	
1216	bindert werden, sich zu schließen. Eschscholzia striata crocea. ©FT. Blume				1	200	Petunia hybrida grandiflora maculata, OTF. Samen von den neuesten großblumigen gestreiften		3	
121	orange mit citronengelben Streifen, welche febr				1	240	und geflecten Gorten, gegenseitig befruchtet.			
	icharf gezeichnet find und ber Pflange ein febr ele- gantes Aussehen verleiben	ELL	10		1		genden ichonen Marietaten :	ra to		
1217	Fuchsia hybrida, h in iconfter Mifchung.	(din	10	13		$\frac{241}{242}$	, roja, dunkelroth genegt bunkellila, schwarz genegt		4	
1218	Gladiolus Gandavensis hybridus, 2 TF.				1	243	n n n totobibitt mit attinbulant, piann denegt	100	4	
	Bon unferem großen Gortiment ber neueften und			131		244	und mit weißem Schlund	uno	4 4	
1219	schönsten Sorten gesammelt 100 Korn 5 Sgr. Gloxinia hybrida grandiflora, Ob Tw.			u		$\frac{245}{246}$	, , purpur, ichwarz genegt, atlasglanzend		4	
	Schon burch den fraftigen Blattwuchs erregen biefe neuen Barietaten ber Gloxinien die Aufmert-		To				n , bläulichweiß, jchwarz genegt. jedr zarteFarbe Phyllanthus spec. nova. Oh T. 25 Korn 4 Sgr.		4	:
	lamtett; Die febr großen, faftgrunen Blatter legen				1	248	Reizende elegante Decorationspflanze und icone			
	fich fo über ben Topf, daß fie benfelben faft ver- bullen; darüber prangen die fehr großen Blumen		1 6	181	1		Acquifition für ben Blumentisch, blübt ichon 4 bis 6 Wochen nach ber Aussaat. Die gefiederten Blätter			
	in den glanzendsten Farben und gartesten Schatti-						(wie bei Mimosa) buntelgrun gur Salfte aichgrau-			-
	rungen und gewähren einen überaus prächtigen Anblic. 100 Korn 3 Sgr. Gomphrena globosa aurantiaca Isabellina.						von entichtedenem Effett jowohl einzeln als zwischen anderen Bflanzen.			13
1220	(.) W. Will weißlich gelben Blumen		10		12	249	Primula farinosa, 4 F., eine sehr hübsche Stande Primula chinensis erecta alba, ht, neue Rlaffe	mo	2	6
1221	nellanthus grandinorus plenissimus. () F.		7½	Ü	1	00	ber Brimel, mo die weißen Blumen zu einem großen			19
	Diese Barietät wird 4-5 Fuß hoch und ift bem H. californicus sehr ähnlich, unterscheidet fich aber				1		aufrechtstehenden Bouquet vereinigt find, das über bie Batter weit hervorragt 10 Rorn 71/2 Ggr.			
	burch seinen eleganten und doch fraftigen Buchs. Die Blumen werden doppelt so groß als die von				12	351	Frimula cuinensis erecta umbriata rocas			
	H. californicus und find bei vollstandiger Entwicke-						Schöne gefrangte, rofenrothe Spielart, mit auf- rechten Blutbenbouquets 10 Korn 7½ Sgr.			
1222	lung fo gefüllt, daß fie gang rund werben. Heliotropium, Dw., von ben neuen und beften Ba-			u.	12	352	Primula chinensis fimbriata punctata,			
	rietaten gesammelt		3				Blumen brillant icarlad = carmpifin mit mein ae-			
	imledenen Karbungen 10 Porn 6 Gar				12	53	primula chinensis fl. albo pl., 10 R. 3 Ggr.			
1224 1225	Iberis umbellata atrococcinea nana of Ipomoea grandiflora alba picta carminea,	4	1	et i	12	54	Rommen beide giemlich conftant aus Camen,			
	foliis argenteo marmoratis. SOTFw. Die herziörmigen Blatter find filberweiß mar-	20.4		51			weider bei olejen gefuutblubenden Barietaten größer	0		
	morirt, die Blumen weiß, glangend carmin punktirt.	61		CI	12	55	als bei den einfachen, und vollkommen flach ift. Salpiglossis hybrida pumila marginata, OTF	-55	4	
1226	Ipomoea hederacea grandiflora atrocar-					10	Riedrigvieibende großblumige Spielart, dunkel-		4	
	minea intus alba, foliis argenteo marmo-				12	56	scharlach mit lila Rand. " maxima psittacina. Reue großblumige Spielarten in brillanten Far-		4	
	Die dreilappigen Blätter find filberweiß marmo-	2	2	N	000	-	Meue grogblumige Spielarten in brillanten Far- bungen, goldgestreift und gestedt.	8		
	rirt, Die Blumen dunkel carmin mit großem weißen				12	57	Salvia graciliflora, OTF., niedrige reichblübende	2		
1227	Lathyrus coeruleus coccineus, § O., rantende		-4	á	av	-	Sommerpflanze mit dichten Rispen, rofalila Blumen, porzuglich zu Ginfaffungen, in der Art wie S. Roe-			
1228	einsahrige Sorte, mit blauen, rothgestedten Blumen Lupinus mutabilis roseus splendens, OF.		4 2		12	58	mariana agatanat	12	2	
	Eine ber ichonften Barietaten; nicht nur die auf- geblühten Blumen, sondern auch die Knospen zeigen						neue goldgelbe Zwerg = Tagetes, jehr gefüllt und		6	
	bet the die ichone intensiv carmin rosenrothe gar-				12	59	ganz constant. Tricyrtis hirta, b 10 Korn 4 Sar.			
	bung, mährend bei der alten mutabilis befanntlich die Knospen weiß sind und beim weiteren Aufblühen		15	-	126	60	Tricyrtis hirta, h 10 Korn 4 Sgr. , fl. nigro, h., schöner als die Species; die Blumen schwarzlich purpur, sammetartig und rosa			
1229	in litaroth übergehen. Michauxia campanuloides, 4F				10		puntitir 10 Rorm 5 Sgr. Tropaeolum Tom Thumb. Lilli Schmidt			
Birth	Brachtvolle Staude, mit großen hellblauen, faft	100	3		126	51 '	(*) IF. Sept zanfretme Blumen nom ichauftan		8	
1230	Myosotis azorica var. coelestina. &TF	tre	10				heusten Scharladroth. Die übereinander gemidelten		deff	
	250m dem 10 beliebten und allgemein verbreiteten	940	10		214	Bhi	Blumenblatter geben ben Blumen ein febr volltom- menes Ausfehen.	(91)	STATE OF	
	Bergismeinnicht ber Agoren, erscheint bier eine neue Barietat mit icon hellblauen, fast turfis'blauen			1	126	52	Tropaeolum Tom Thumb coeruleo-roseum, OTF. Bon rosa Farbe mit blau unterlegt. Da die		12	
	Blumen. Diefelbe ift gang conftant und, da im Nebrigen Bau und Sabitus ber Bflange gang ber			1			in's Blane neigende Farbe bis jest bei diefer 216.	7194		
	alten Species gleichen, wird the ebenio mie biefe	7		1			theilung ber Tropaeolen unbefannt mar, fo mirb			
1004	eine fehr willtommene Bereicherung unferer Blu- mengarten fein.	300		1		n Ha	ift fehr fompatt im Sabitus und außerordentlich reichblübend.			
1231	Nemophila discoidalis nigra. OF. Die Blume, wenn noch nicht zu lange offen, vollfommen pech-			-	126	3 7	Propaeolum pyramidalis coccineum, OTF.	yo di	8	
1229	10DDdr2		10 .	Name and Address of the Owner, where	ni dei		Byramidenförmiger Buche, die Blume icharlach = roth und fehr icon.			
1200 .	Nerium Oleander coccineum, hT. Nerium gloriosa, biverse Barietäten		5 2½ .	1	125	5 1	Viola cornuta. O. F. oine rierliche Succied found	1		
1234	Mierembergia frutescens. DTF.	101	10 .		100	0 =	Viscaria elegans picta, OFT.		5	
100	Dieje halbstrauchartige Urt bilbet fehr elegante Buiche, welche fich vom Juni bis gu ben berbft-			NO CAN	126	0			10	
	als bei N. gracilis und lebhafter gefärbt. Es ift			-			bracht murde. Der Mittelbunft der Blume ift bunfel-		wa.	
	eine fehr zu empfehlende Reuheit fur Gruppen und Ginfaffungen.			Mark San		115	carmoifin, das gegen ben rein weißen Rand bin in ein helles Scharlachroth übergeht. Gehr ichon fur			
			1				Einfaffungen oder als Gruppenpflange.	134	1	

# Auszug und Supplement des Baumschulen- und Pflanzen-Ratalogs.

### Obstbäume und Fruchtsträucher.

Unfere Baumichulen befinden sich in durchaus ungeschütter, ben Winden vollständig ausgesetter Lage, bei trocenem Boden, so daß die hier gezogenen Bäume und Sträucher auf jedem anderen Boden gut fortgeben und auch für die öftlich und nördlich gelegenen Länder zur Aupflanzung befonders geeigenet find. Sorten, welche auf den verschiedenen deutschen Bomologen-Berfür godie dem bewergen wie det Archein und Birnen biejenigen Sorten, welche auf den verschiedenen deutschen Bemologen-Berfammlungen empfohlen wurden. Bet Aufträgen, wo uns die Bahl überlaffen bleibt, bitten wir zu bemerken, zu welchem Zweck (ob für die Tack), Allerbichaft, ob für Sommers, herbst oder Winterbedarf) die Früchte besonders Berwendung sinden sollen, und wir werden nach besten Krätten biefen Bümischen Rechnung traden.

Bur Bwergbaumfultur werden nur die beften hierfur geeigneten Sorten verwendet mit besonderer Rudficht auf diejenigen vorzug. Bur Bwergbaumfultur werden nur die beften hierfur geeigneten Sorten verwendet mit besonderer Rudficht auf diejenigen vorzug. Bic Bflanzlöcher muffen besonders für hochtamme ziemlich groß, 4-5 Fuß im Durchmeffer, gemacht werden. Gang besonders machen wir darauf aufmerksam, daß die Baume nur wieder so tief gepflanzt werden durfen, wie sie geftander baben.

Wir nennen hier nur einige Gorten unferer Obstfammlung, unfer Baumichulen-Katalog enthält die vollständige Aufgablung nebft Be ftanden haben.

fchreibung 2c. ber einzelnen Sorten. Much Special-Rataloge uber Obftbaume 2c. fteben gu Dienften.

1277 Impatiens Balsamina atrosanguinea ple-nissima. Beschrieben als die dichtgefüllteste ber Balsaminen, welche bis jest gewonnen worden ist; constant, bringt aber wenig Samen. 10 Korn 6 Syr.

1278

"Solferino. Blume groß, weiß mit Allas-glanz, sia und icharlach geitrickelt und gestreift; eine vorzügliche und effektvolle Neuheit, 10 K. 6 Sgr.

#### Mepfel.

\* bedeutet Tafelfrucht, + Birthicafts-Erflärung ber Zeichen: \* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthicaris-frucht, für den zweiten Rang werden die Zeichen verdoppelt, für ben ersten Rang noch ein ! zugefügt. S. H. W. bruden die ReifBeit im Commer, herbst ober Winter aus. — Die vor bem Ramen ber Corte stebende 3abl ift die Rummer bes Sortiments. Hochstämmige Aronenbaume a St. 12% Sgr.; schwächere a St. 12% Sgr.; ichwächere a Sochftammige Aronenbaume in Sorten unserer Bahl bas Schriften in Spir.; fcmachere bas Schod 16 The Phramiben auf Wilbling verebelt a St. 72-12 Sgr.

unübertreffliches Material gur Befleidung, jowohl fonniger Abhange, als auch tieffcattiger Blage unter

2½ 2½ 15

13/2

21/3

immergrunen Baumen.

1305 Prunus lusitanica . . .

Spaliere, doppelte und einfache Schnurbäumchen (Cordon double et simple) auf Doucin und Naradies veredelt à 7½—15 Sgr; gang ftarfe Spaliere unserer Mabl à St. 17½ Sgr. bis 2 Abtr. Einjührige Beredelungen auf Witbling in Sorten unserer Rahl bis zu 5 Jul. höhe à Schock 7 Thir.

bis zu 5 zuß höhe à Schoc 7 Lhir.

4 Annanasapfel, rother, h. — 66 Alantapfel. \*\*††W. —

7 Bohnapfel, großer (Abeinischer Bohnapfel). ††W. S. — 119 Vorsborfer, Böhnischer gestreifter. \*\*††W. S. delter Kinter. (Goelborsdorfer). \*\*†††W. 20 Seefest. \*††H.W. 2 zwiebel. \*††W. —

1 Bürgerherrnapfel. ††H. W. — 5 Calville, Kother Herbit. ††H.W. — 70 Citronenapfel, Bünters. \*††W. — 70 Carvinal, rother. ††H.W. — 70 Citronenapfel, Bünters. \*††W. — 72 Cefenhagener, Keller's \*††H. — 14 Crobecrapfel, englischer. \*††H. — 14 Ginbeer-Affel, langer. ††H.W. — 97 Goldzugapfel. \*\*††W. — 102 Gravensfeiner (Gräßensteiner). \*\*††H.W. — 41 Hinbeer-Affel, langer. ††H.W. — 4 Hiller's \*††H.W. — 63 Anntapfel, Dangiger. \*\*††H.W. — 22 Baradiesapfel, gestreiter Bünter. \*††W.S., — 68 Barmäne, engl. Linter-Golds \*\*†† Nov. 14 Bepping, englischer Golds \*\*†† Nov. 37 scharladrothe. \*\*††H.W. — 14 Pepping, englischer Golds \*\*†† Nov. 37 scharladrothe. \*\*††H.W. — 85 Nambour, rother Sommers, †† Sept. Oct. — 17 Neinferte, Burchard's \*\*††W. & Garneter's \*††W. & Barter's. \*††W. & große Casteler. \*†† W. & Starber's. \*††W. & Starber's. \*†† W. & Starber's. \*† W. & Starber's

\*++ W. - 65 Tanbenapfel, rother. \*\*+ W., 149 weißer Binter-\*\*+ W.

#### Birnen. War ausgest gange

Sochftämmige Kronenbaume à St. 121/20 Sgr.; gang ftarfe a St. 1 Lbir.

nach unferer Mabl bas Schod 24-29 Thir. phramiben und Epaliere (Birnen eignen fich nicht gut für Schnurbäumchen, Cordons), die beften, geeignefften Sorten, auf Wildstamm ober Quitte veredelt, je nach der Stärke:

Phramiben & St. 74—20 Sgr.

Epaliere & St. 10 Sgr. bis 1 Lbfr.

Außerbem besiten wir einen fleinen Borrath gang ftarker Byra-miben und Spaliere bas Stud bis 2 Thir. Die Beichen find biefelben wie bei ben Mepfeln.

Die Zeichen sind dieselben wie bei den Aepseln.

57 Apotheferhirn, Sommers. \*††8. — 1 Bergamotte, große Sommers. \*††8. 8 rothe. \*††1H. — 63 Butterbirn, Clairgeau's.

\*\*IH. 66 Die's. \*\*†w. 19 graue Serbst. \*\*†H. 20 weiße H. 40 H. 20 große.

\*\*H. W. 74 bolzfarbige. \*\*††H. 11Rappleons. \*\*†H. 20 weiße Herbst. \*\*†H. — 23 Capiaumont. \*††H. — 126 Dechantsbirn, graue. \*\*† H. — 73 Gierbirn, Sommers. \*††18. — 55 Flassen.

birn, Boc's. \*\*††. — 14 Foreslenbirn. \*\*†H. W. — 155 Frauenstein, graue. \*† H. — 47 Geraftsbirn, \*\*H. — 79 Kagenforf, gweğer französischer. ††W. — 48 Knausbirn. \*†H. — 13 Köstlisse bon Charnett. \*†H. — 6 Mindnetsbirn, rinde. \*††8. — 47 Missenschler, sie lange Sommers. \*††. — 54 Edemain. \*\*!W. — 42 Edmail, birn, sömische. \*\*††! S. — 148 Sommerdorn, punstirier. \*\*††! Sept. — 15 Sparbirn (Cuisse Madame). \*\*†8. 50 Tafelsbirn, grüne. \*††8. — 85 Volksmauserbirn. \*††H. — 7 Wildsling von Motte. \*\*†H.-W.

#### Diverse Obstsorten.

Luitten à St. 5 Sgr, ganz ftarke à St. 15 Sg Mispeln à St. 6 Sgr., hochftamme à St. 12 Sg kirschen, süße, hochftammige Kronenbaume à St. 12½—15 Sgr., set ftarke à St. 25 Sgr. — 1 Thir., schwäckere à St. 10 Sg nach unserer Wahl à Sch. 18—22 Thi Formenbaume gew. Sauere, hochftamme à St. 7½ Sgr., à Sch. 11 Thi Ottheimer Weichslef, strauchartig à St. 7½ Sgr., à Sch. 11 Thi	fr.
. Swattenmoreue, imone Spattere . a St 10 Sar _1 861	10
Maumen, hochtammige Kronenbaume, die besten Sorten à St.	
Spaliere und Corbons 1.5—20 Sg. 3mergbäume in den besten Sorten â St. 12½—30 Sg. 4m. 2 Sg. 7½ Sg. 3mergbäume in den besten Sorten â St. 12½—30 Sg. 4m. 2 Sg. 7½ Sg. 4m. 2 Sg. 7½ Sg. 4m. 2 Sg. 7½ Sg. 7 Sg.	ir.

Ballnüffe, fehr ftarfe Stämme à St. , 3werg. (Iuglans fertilis) trägt icon gang fleir	20 n; i	Sgr.— in Busc	1 Thir.
Edte Raftanien, hochftämmig .  niedrige, bufchige Rornelfirschen Rosenapfel. R. villosa (echte Sagebutte)		à Gt.	6 Sgr. 25 Sgr.
Obstwildlinge.	35	100	1000
Die Berichtebenheit ber Preise bezieht fich auf bie Starte ber Baumchen.	abr	Stück	Stück
Apfelwildlinge, fehr ftarke, verpflangte	3 2 1 2	15/6 5/6-1 11/2-2	10 - 15 7- 11 3- 6 9- 14
Kirfchemwitdlinge, füße. Pflaumen Apfelftämme ) Unterlage für Nepfel- Zohannisapiel (Doucin) ) wergbäume. Duitten (Unterlage für Zwergbrinbaume). Steinweichsel (Unterlage für Kirfchenzwergbäume).	1 1	$1^{1}/_{2}$ $2$ $1^{2}/_{3}$ $1^{2}/_{3}$ $1^{2}/_{3}$ $1^{1} _{2}$ $1^{1}/_{3}$	2-6 10 18 15 15 13 10

#### Obstorangerie.

Bir halten immer eine vorzügliche Ausmahl von Aepfeln, Birnen, Ririchen, Apritofen und Pfirfichen in iconen, mit Enospen verfebenen fremplaren, in Löpfen gezogen, vorrathig. Der Breis richtet fich nach ber Starte .

Der Breis richtet sich nach ber Starte . bas Stud von 1-2 Thir. Baumchen in Sorten und auf Unterlagen, welche fich fur biefen Zwed besonders eignen. . . 12 fraftige Stamme 4 Thr.

#### Beerenobit.

Die vollftandige Aufgablung unferer Sortimente, fiebe Bflangen- und Baumichulen-Ratalog.

#### Erdbeeren.

#### Allernenefte.

Die Beschreibungen bei diesen Menheiten find die der Buchter.

telle Cauchoise (Acher). Die große ober sehr große Frucht oval, lebbast tirschroth mit hervortretenden Kernen; Fleisch roia, fest, butterhaft, gezuckert, sehr fein varfümirt. Aflanze träftig; Reife mittelfrüh. Sehr empfehlendwertse Barietat a. Set. 223 Segr. Octor Hope (Bredley), krycht aufter Edika bar fest in der octor Hogg (Bradlay). Frucht erfter Große von langlich-ovaler platter Form, manchmal habnenkammförmig, lebhaft prangerofa mit febr hervorstechenden Kernen; fleisch rein weiß, voll,
fett, butterhaft, sattreich, gezudert, außerordentlich reich und
yarsumirt. Pflange jehr trätig, gedrungen und außerordentlich
reichtragend. Die spateste der großen Erdbeeren und dadurch,
und durch ibre anderen vorzüglichen Eigenschaften eine wertsnosse Vermissten.

une outen ibre anveren verziggitigen eigeniggaren eine netter-volle Arquifilition . . . à St. 22½ Sgr. Her Majesty (Mme, Clements). Schöne Brucht erfter Größe von regelmäßig konischer Form, glangend karmossinroth mit bervor-tretenden Kernen. Bleisch weiß, fest, voll, saftreich, sebr ge-zudert und ungemein parfümirt. Die Pflanze gedrungen und

	colors and any assembling on an inter-district strategic strategic
träftig, sehr reichtragend. Mittlere Reifzett. Sehr embfehlens werthe Aarietat  Jeanne Hachette (Gloede). Schöne große Frucht von flumpstonischer Form, blagrosa mit braumen hervortretenden Kernen; Fleisch schmeweiß, sehr, sehr gezuckert, saftreich und icon variamirt. Die Pklanze ist gedrungen und träftig, von der chilensis abstammend, doch durch ihre reiche Tragbarfeit von dieser verschieden. Keist hat . a. & ct. 20 Sgr.  Julie Guillot (Guillot). Frucht groß, von runder Korm, glänzend zinnoberroth, Kerne wenig bervortretend, Fleisch saftvoll gezuckert und parsimirt. Pklanze fraftig und sehr fruchtbar. Schöne, gute mittelsrühe Frucht.  La petite Marie (Boisselot). Schöne mittelgroße Frucht von platter, länglicher Form und lebhaft glänzender Färbung; Fleisch roth, voll, set, sehr saftreich und von zuckersüßem, erhabenen Geschmack. Diese ist die vorzüglichste Beere für den Keinschmecker. Die Pklanze ist fraftig doch menig blattreich, sie stammt von Sir harry und trägt erstaunlich reich.  Monsieur Radclysse (Ingram). Frucht erster Größe mit wechzelnder Form, lebbast vrangeroth, die Kerne hervortretend; Fleisch rein weiß, seft, voll, saftreich, sehr gezuckert und mit einem föstlichen Arom. Phanze frättig und ungemein reichtragend. Reisch parse fraktig und ungemein reichtragend. Reisch spär	Ananas perpétuel (Gloede). Reue wirklich immer tragende Ananas Gerbeere. Wer diese Erbbeere kultivirte, erkennt diese auch als eine wirkliche "immer tragende" an. In unse Gärtnerei blühete und trug sie die schönken Krüchte von ersten Erbbeerzeit an bis October. Die Krucht ist mittelgr sehr sakreich und hat einem guten Geschmaac. Die Pflanze wäsiehr kräftig 12 Sc. 2°/2, Shr. à Sc. 1.8 Sc. 18
ründer ober ovalet, manchmal geläppter Form; brillant zinno- berroth mit hervortretenden Kernen; Fleich oria, jattreich ge- gudert und parfümirt. Die Bflanze wächft gedrungen, fräftig und fruchtdar. Mittelfrüß. Diese Barietät wurde von der So- cieté Impériale et centrale, prämitirt & E. 228 Sgr.	Manken.  Triomphe de Hollande. Theilweise remontirend mit sehr gre- saftigen Früchten
Roi d'Yvetot (Acher). Frucht groß ober fehr groß, von wechselnder Form, buntelroth; Fleisch roth, sehr gezudert und parfumirt. Die Phanze machft gedrungen, fraftig und trägt sehr reich. Mittelfrüh. Ift eine zu empfehlende Barietät. a St. 22% Sgr.	Aeltere ausgezeichnete Sorten.  12 Stüd in 12 Sorten mit Namen
Diverses L	Beerenobst.
Himbeeren, je nach Reuheit ober Seltenheit: à St. und Sorte von 1-10 Sgr.	Stachelbeeren, neueste amerikanische, zeichnen fich baburch au g
Johannisbeeren. Bir kultiviren von biefer angenehmen Frucht ein ausgemähltes Sortiment und geben bas St. je nach ber	" neue englische Preisbeeren, vorzüglich großfrüchtig 12 St. 22 a St. 6
Brombeeren, amerifanische à St. 12 Sgr.	" ältere beutsche und englische vorzügliche Sorteu 12 St. 1 % & Et. 3
Lawton ober New-Rochelle	Weinstöcke in 60 alteren, neuen und neuesten gang vorzügli Sorten à St. 4-8 g, recht starke
Feigen, die besten Sorten à St. 7½ Sgr.	THE R. P. LEW. WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART
Zierbäume m	nd Sträucher.
6 Stüd in 6 Sorten scholüssender Ziersträucher unserer Wahl  25 , , , 25 , , , 3 , 10 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 8 , 15 , 15	25 Stück Sträucher in 6 Sort. unserer Wahl 1 Thir. 15 50 " " 10 " " 3 " — 100 " " 125 " " 12 " — 100 " " " " Mommet " 7 " — 1000 " " " " Mommet " 50—100 Sorten un A 1000 " " Bierbäume und Träucher in 50—100 Sorten un A Wahl 1000 ]
Durch die für den Maffenbezug ungewöhnlich billig geftellten Pro Geholze fur größere Aulagen zu erleichtern. — Die Preise gelten nur	eife hoffen wir unferen geehrten Abnehmern bie Anwendung ber bef für die genannten gahlen.
Rofen.	Meebäume.
Diese bilden einen bevorzugten Kulturzweig unserer Baumschulen. Der Raum gestattet uns hier nicht, die Sorten aufzusühren, noch weniger sie zu beschreiben und verweisen wir auf unseren Baumschulen- und Pklangen-Catalog, den wir gern auf Wunsch übersenden. Wir geben nach unserer Wahl:  a. hochstämme von 4-6 Kuß Höhe.  Das Stück 5 15 15 gr.  12 in 12 Sorten 5 15 7 15 gr.  60 in 25 Sorten 25 7 - Stürkstelkümme in Töpfen à St. 25 Sgr. bis 1 Thse.  Das Stück 4 12 sin 12 Sorten 5 15 ft.  d. Mittelstämme 2-3% Kuß Höhe.  Das Stück 4 15 gr.  c. Niedrig veredelte und wurzelechte.  Das Stück 2 12 in 12 Sorten 20 7 - 60 in 25 Sorten 20 7 - 7 c.  Das Stück 2 15 greten 20 7 - 7 c.  Das Stück 2 16 greten 20 7 - 7 c.  Das Stück 2 2 7 - 7 c.  Das Stück 2 2 7 - 7 c.  Das Stück 3 2 2 7 - 7 c.  Das Stück 4 2 7 - 7 c.  Das Stück 4 2 7 - 7 c.  Das Stück 5 orten 2 2 7 - 7 c.  Das Stück 2 2 7 - 7 c.  Durzelechte, zum Bepstanzen von Gruppen geeignete Sorten.  La reine, Carmolsin supérieur, Général Jacqueminot, Hermosa, Jules Margottin, Louise Odier, Mistress Bosanquet, Souvenir de la Malmaison etc.	Acer dasycarpon, raubfrüchtiger Aborn 15 Negundo, eichenblättriger Aborn 18 Negundo, eichenblättriger Aborn 18 Negundo, eichenblättriger Aborn 18 Negundoles, Spis-Alporn 15 Platanoides, Spis-Alporn 15 Platanoides, Spis-Alporn 15 Negundoles, Neger Alporn 15 Negundoles, Neger Aborn 15 Negundoles, Neger Neger 15 Negundoles, Neger 15 Neger 1

S. б.   St.   Til. Su	€t.
Populus dilatata, italieniiche B., Byramiben-B. 10 73 Quercus cerris, türliiche Eiche 20 15 "Robur, Stein-Eiche, Binter-Eiche 10 "pedunculata, Sommer-Eiche 10 Robinia Pseud-Acacia, gem. weißblihenbe Afazie 12 74 "inermis, Angel-Maxie 30 175,	Cotoneaster microphylla 55 " rotundifolia 66 Crataegus pyracantha 66 Daphne Laureola 7% Empetrum nigrum 66 Erica, diverse Sorten, jede 5-6
, inermis, Augel-Afazie . 30 17% Sorbus aucuparia, gem. Ebereiche, Bogelbeere . 12 7½ Tilia platyphyllos (grandifolia), Sommer-Linde, holl. Linde 45 30 17% . , ichwächere . 30 17% , ulmifolia, gem. Linde, Winter-Linde . 30 17%	Evonymus japonica 24,
,, dasystyla, raubgriffliche Krim-Linde, großblättrig und febr schön, stark	,, radicans fol. var. Hedera (Epheu) je nach der Sorte 2—7½ Helianthemum, biperfe 4
Tranerbäume.	Hypericum calycinum   3   3   1beris sempervirens   3   1lex, biverje €orten   6-15
Petula (Birfe) populifolia laciniata	Kalmia angustifolia         10           "latifolia         12½           Ledum angustifolium         10           "latifolium         7½
,, pygmaea 10-25, ,, arenaria (gracilis) 10-25, Crataegus (Reißborn) Oxyacantha pendula 20 Cytisus (Bohnenbaum) alpinus pendulus 15, , Laburnum pendulum 15, purpureus 15,	Mahonia, biterie Gorten   5-30
, purpureus	Rhodora canadensis
n, lentiscifolia pendula 22½ Ilentiscifolia pendula 20 Juglans (Stefupulme) Aquifolium pendula 50 Juglans (Stallnus) regia pendula 50 Populus (Bappel) tremula pendula, ect 30 Prunus (Ririche) avium pendula 17½ Quercus (Ciche) pedunculata pendula 45 ", ", salicifolia pendula 20	"flaccida 71/2 Außerbem find es alle im Sortiment aufgeführten Coniseren (mit Ausnahme von: Pinus Larix, Salisburia adiantifolia, Taxodium distichum), betreffs berer wir auf unseren Pflanzen- und Baumschulen- Catalog ausmerksam machen.
Robinia (शिंद्रांष्ट्र) Pseud-Acacia pendula	Gehölze mit besonderer Färbung des Laubes
saix (20010) annuaris (0 abytonica crispa) 5  " americana pendula, hodyftämmig 15  " babylonica 6–8 Suß 10  " caprea pendula 30	oder der Früchte.  6 verschied. Gehölze mit besond, Färbung des Laubes 1 Thir. 20 Sgr. 6 , , , bunten Blättern
, nigra pendula (Napoleonis Hort.)	6 " " " jierenden Früchten 1 " - "
Tilla (Linbe) americana pendula   20   20   20   20   20   20   20   2	Sträncher für Haide- und Moorerde.
microphylla pendula 15, montana pendula 17½	6 verichiebene Sorten mit Namen 1 Thir. 15 Sgr. Azalea pontica, wohltredenbe pont. Azalie mit Knospen à St. 10 Sgr. , " Bon prachtvollen Hybriben 6 St. nach unserer Wahl 22% Spir. Erica herbacea, niedrige Halde à St. 5 Sgr. Kalmia latifolia, breitblättrige Kalmie , 12½ " Hydrangia hortensis, Hortensie . , 5 ", 5 ",
Schlings und Aletter-Sträucher.  Ampelopsis hederacea, starke	Hydrangia hortensis, Sortenfie , 5 ,, ,, , , , , , , , , , , , , , ,
Aristolochia Sipho	Ausdauernde Staudengewächse.
Ampeiopsis Nederacea, tarte  ", ftarfe in Töpfen 10-20 Aristolochia Sipho 745  ", ftarfe in Töpfen 10-30  ", ftarfe in Töpfen 10-30  ", ftarfe in Töpfen 10-30  ", 75  Caprifolium, biverfe Arten, jede 4-8  Cleastrus scandens 74  Clematis. Wir fulftbirten ein außgezeichnetes, großes Sortiment  und geben, je nach der Seltenheit, das Sind mit 2-35	12 schönblühende und bekorative Sorten mit Namen 1½ Thir. 25 bergl
Glycine chinensis . 10 Hedera (Ephen), je nach ber Sorte und Stärke . 2-71/2 Rletter-Nosen in schönen Sorten . 72 Menispermum canadense . 5 Dariel " carolinianum . 5	Nusdauernde Farrnkräuter. 6 St. in 6 Sorten 17½ Sgr.
renpioca graeca	Topfnelfen.
Tecoma grandiflora	(Dianthus caryophyllus fl. pl.)
Gehölze zur Bildung immergrüner	Auch hier verweisen wir auf unseren Baumschulen- und Rflangen- Ratalog, welcher die Aufgablung und Beschreibung ber einzelnen Ba- rietäten enthält.
Gruppen.	Wir geben nach unserer Wahl: 12 Sorten für 1 Thir. 15 Sgr.
Andromeda Catesbaei	25 " " 3 " — " 15 " 15 " 15 " 17 " 17 " 17 " 17 " 17
Aucuba japonica hinaria Paristitan is nod han Saltanisti	Remontant-Nelken.
Buxus, biverfe Arten	4 Sorten à 1 St 25 Sgr.
the state of the s	

#### Gladiolen.

Rachftebend find die iconften Arten und Barietaten biefer prachtvollen Fride aufgeführt, und durfte unsere Cammlung, besonders was die wundervollen Sphriben des Gl. Gandavensis betrifft, die reichhaltigste Deutschlands sein.

vie wundervollen Hyperden des Gl. Gandavensis betrifft, die reichfaltigfte Deutschlands sein.
Die Kultur der von Gl. Gandavensis entsprungenen Sybriden verlaugt gar feine besondere Sorgfalt, es genügt, sie in gut bearbeitete, vor langerer Zeit gedüngte Gartenerde zu pflauzen. Zu kompatten und kiefigen Boden nögen sie nicht; am besten gedeißen sie in einem noch ber längerer Zeit gedüngte Gartenerde zu pflauzen. Zu kompatten und kiefigen Boden nögen sie nicht; am besten gebeiben sie in einem noch feischen, jungfräulichen Boden. Die Zwiebeln mehrere Zahre auf dieselbe Stelle zu pflauzen, wirtt sehr verderbendringend: wenn irgend möglich, bein gehorig mit Pferde- und Kuhdung; ist der Packen feight dann, nur mit dem angeleben Ort zurück. Mährend dieser Zeit dungt man den Boden gehörig mit Pferde- und Kuhdung; ist

komme man nicht vor drei Jahren an denselben Ort zurück. Während dieser Zeit dungt man den Boden gehörig mit Pferde- und Kuhdung; ist der Voben sencht, dann nur mit dem ersteren.

Um eine früße und langdauernde Flor dieser herrlichen Pflanze zu haben, pslanzt man von Ansang oder Mitte April, je nach dem Wetter, von 14 zu 14 Tagen bis Ende Juni, in einer Entsernung von 10—15 Joll und, nach der Größe der Zwiedeln, 2—4 Joll tief. Für die erste Flor wähle man jedoch die ftärften Zwiedeln, da diese immer etwas früher als die kleineren blüßen werden.

Um die Blor noch früher, Ende Juni, Ansang Juli zu haben, pslanzt man Zwiedeln ichon Ende Februar in Töpse und läßt sie austreiben. Man halte sie aber nicht zu warm, damit sie sich nicht überwachsen; später bei Eintritt guten Wetters pslauzt man die Zwiedeln, nachteriken. Man halte sie aber nicht zu warm, damit sie sich nicht überwachsen; später bei Eintritt guten Wetters pslauzt man die Zwiedeln, nachteriken. Das Begießen ist während des Kachsthums sehre.

Das Begießen ist während des Kachsthums sehre versäumt werden.

Der Nicht darf dasselbe bei trocknem heißen Wetter nie versäumt werden.

Im herbite, wenn die Stengel absterben, nimmt man die Zwiedeln sind werden. Für Bouquets eignen sich die Gladiosen zu dersiehen der vorziglich, da die noch unentwischelten Knosken, wenn die Bläthenstände in Sussifiend, ab die noch unentwischelten Knosken, wenn die Blüthenstände in Sussifiend werden, sich zu vorziglich, da die noch unentwischelnen Knosken, wenn die Blüthenstände in sussifien an einen kollfommenen Blumen entsalten.

Gruppen der Gladiolen sehen am besten aus wenn noch andere mit ihnen harnonirende Klanzen dagwischen schalog.

Gruppen der Gladiolen sehen am besten aus kerden nur bühdbare Zwiebeln abgegeben und ind für diesen das vorziglich, da die noch unentwischelen Knosken, wenn die Knosken und Knosken und Kunnschalensen unseren der kläbaben abgegeben und ihn für diesen das besteile verben, der einzelnen Estwerden unseren Manzen und Baumschulen-Catalog.

Geleben an ei

Colorirte Abbitdungen recht hübicher Barietäten unseres Sortiments haben wir namentlich für diejenigen unserer werthen Kunden ansertigen lassen, welche diese reizende Blume in ihrer bewundernswerthen Bervollkommung gar nicht oder nur wenig fennen; gern senden wir die Bilder auf Bunich gratis zu.

#### Gladiolus Gandavensis hybridus.

Daß man bei uns die Glabiolen-Sybriden in eben ber Bollfommenheit wie in Frankreich ziehen kann, bavon hat fich Jeber, welche unfer Stegliger Ciabliffement mabrend der Blutbezeit berselben befuchte, überzeigt. Außerdem hatten wir in der Ausstellung bes Acclimatisations Bereins in Berlin, die in der letten Salfte des September stattfand, noch ein Sortiment von 163 Barietaten in vollkommen entwickelten Bluthen glucken ausgestellt, trobbem der vergangene Sommer gerade nicht zu ben gunftigsten gezählt werden konnte.

Renheiten	für	1868.
-----------	-----	-------

©td. 5g 202 Alexander	\$\\\ \text{Std} \\ \text{Sgr} \\ \text{208 Isabelle} \cdot \text{.22'} \\ 209 La Favorite \cdot \text{.23'} \\ \text{209 La Favorite} \cdot \text{.55'} \end{align*}	114 Mozart	120 Stella
204 Citrinus	111 Léonora	116 Oscar 35 117 Princesse Alice 64 118 Rossini 55 119 Semiramis 64	124 Urania 6

#### Reuheiten bes Jahres 1867.

	Reuheiten des	Julies 1001.	199 Sir William Hooker (S.) . 4
190 Ad. Brogniart	196 Noémie (S.)	197 Princesse Marie de Carabridge (S.) 64 198 Révérend Berkely (S.)	ood Mr. Maara (8)

#### Barietäten früherer Jahrgange.

31 De Candolle . . . . . . 17½

	- 29
Std.   Sgr   143 Pallas   145 Pelson   145 Pelson   146 Pensis   147 Peter Lawson   147 Peter Lawson   148 Pline   150 Prémices de Montrouge   151 Président Doumet   152 Princes impérial   153 Nemésis   44 Pénses   154 Pelson   156 Prémices de Montrouge   157 Président Doumet   158 Princes impérial   158 Nemésis   44 Princes Clotilide   157 Princes Clotilide   158 Ninon de Lencios   158 Mentiliam   158 Mentil	2½ 168 Sulphureus
154 Princess Clotilde   24   154 Princess Clotilde   25   155   Frederick William   25   26   27   27   27   27   27   27   27	6 174 Vesta
General Genera	eorginen.
Die Versendung beginnt, sobald es die Witterung er Topsfinollen, oder in frästigen, gut bewurzelten Pflanze Die Zahlen in () drücken die Höhe in Jußen aus.	eine der gestellt ungenern verbutemmlich verzen bei gentem ind viel einer wie menengratigen die leider, die Erführenkalde haufig in 39 er meile einer Korrenbenbume, delne andere Blume tann diete
2 Amateur Rosé (Bruant). Blume groß, gut gebaut und von guter Haltung, icharlach-orange, niedlich mit goldgelb gespitt; manchmal ist ein Kheit der Blumenblätter mit einem goldgelben Rande, mie gemisse Gamellien, geziert (4) 3 Carlotta Ferrand, gelbchamois marmorirt, blutroth gesprist und gesteif (4) 4 Comtessa Suffia Mazuchetti, chamois mit carmoisin gestreist ind gesprist (4) 5 Dentscher Turnergruß (Sck.), carmoisinbraun, abmechselnd mit weisen Spisen (3) 6 Dentsche Goldsonigin (Sck.), ichön goldchromgelb mit lackrothem Centrum; sehr schön (4) 7 Dentsche Goldsonigin (Sck.), ichön goldchromgelb mit lackrothem Centrum; sehr schön (4) 7 Dentsche Wose, rosacarmin mit blaßtila Rücseite; große schöne geregelte Blume (4) 8 Elie Dassel, schoneweiß mit blaßtila Rücseite; große schöne geregelte Blume (4) 9 General Bogel v. Kalkenstein (Sck.), bellseuercarmoisin mit wöllig constantem, kaskanien und schwarzbraunem Centrum u. blassem Rand (4) 9 General Bogel v. Kalkenstein (Sck.), bellseuercarmoisin mit wöllig constantem, kaskanien und schwarzbraunem Centrum u. blassem Rand (4) 9 General v. Moltse (Sck.), seuchtend mennigzinnober mit bellsgeben Rande. 9 General v. Moltse (Sck.), seuchtend mennigzinnober mit bellsgelbem Rande. 1 General v. Moltse (Sck.), seig mit tila, bell- und duntelcarminviolet gestreift, in kugelrunder wahrer Centisoliensorm. Arachtvoll (5) 9 Gestreifte Rose (Sck.), seiß mit tila, dunfelroth gesprensivelt gestreift, in kugelrunder wahrer Centisoliensorm. Arachtvoll (5) 9 Gräßin Swinarsta (Sck.), sehr schon beschalte; sehr reicher klor und schone Saltung (4) 11 23 Marzo 1848, mildweiß mit tila, dunfelroth gesprensivelt gestreift, in kugelrunder wahrer Centisoliensorm. Prachtvoll (5) 12 Marzo 1848, mildweiß mit tila, dunfelroth gesprensivelt gestreift, in kugelrunder Gesch.), sammetig purpursidariach auf duntelgoldbarbigen (8 runde.) Hume groß, von dorsiglischer Form und Haltung; reinstes Schneeweiß (4) 12 Madame Edouard André (Bruant.) Slume groß, von dorsiglischer Form und Saltung; reinstes Schneeweiß (	seichnet (2)  216 General Tom Thumb, bunkel-ijabelle auf scharlach-orange (3)  317 Possatter G. Reinhardt (8ck.). Hellstunober mit goldzelbem Rand; drächtig (115)  218 Berle (Mard.), rein weiß (2)  219 Pihin (Mard.), lisa (2)  220 Pirinseß Mice (Mard.), vrächtig rosa, sehr schöner Bau.  221 Postringeß Mice (Mard.), vrächtig rosa, sehr schöner Bau.  222 Pirinseß Mice (Mard.), vrächtig rosa, sehr schöner Bau.  223 Peutsche man an eine schöne Georgine stellen kann (2). 45  224 Pwergenslirst (8ck.), bestsinnober mit goldzeß; prächtig (135) 25  222 Pwergtönigtn (Mard.), violet mit weißen Spigen (2). 10  223 Deutsches Schrenkind (8ck.), purpurcarmin mit silberweißem Rant; seinite Kosenson (8ck.), bunkel-purpur-kirschord mit rosa ilia Rucheite und Grund, und glüßend senergammisst ning. Rene Farbung (4)  225 Deutsches Schrenkschen (8ck.), blenbendes Weiß; sowohl in Korm, habitus und klor ausgezeichnet (4).  226 Frant Passon Hother (8ck.), weiß mit blaßblauen Spigen und dunkelblauem Ennteum; sehr blumenreich (3). 30  227 Gruß an Scotskewis (8ck.), nielet-pfirschlüthen, nach außen mit belblauem Kander (3). 10  229 Fleine Corbula (8ck.), meiß mit rosa Andauch; seine Form (5) 15  220 Reine Genterum (4)  231 Reiner Khäner (8ck.), resprischblüthen mit silberweißem weißen Eentrum (4)  232 Reine Genteum (8ck.), resprischblüthen mit silberweißem weißen Gentrum (4)  233 Rleine Schnereschen (8ck.), resprischblüthen mit silberweißem Rand; sebr blumenreich (3)  233 Rleine Schnereschen (8ck.), resprischblüthen mit silberweißem Rand; sebr blumenreich (3). 20  232 Rleine Schneresche (8ck.), resprischblüthen mit silberweißem Rand; sebr blumenreich (3). 20  233 Rleine Schnerescherte (8ck.), resprischblüthen weißen Saltung (5). 10
umd da eine Blume mit Fleischfarbe durchfest; ichm (4)	234 Kleines Mohrentind (Sek.), sowarzbraum, jehr blumenreich und constant. Ein wundervoller Listuit (4) 40 235 Listuitschwester (Sek.), alabasterweiß mit hell-carmotsin scharfter (Sek.), alabasterweiß mit hell-carmotsin scharfter (Sek.), art weiß, mit lila-violettem Kand (3) 15 237 Madame Krische (Sek.), zart weiß, mit lila-violettem Kand und Centrum; blumenreich (4) 15 238 Marie Archer (Sek.)

#### II. Zwerg-Georginen.

Stolze bon Röftrit (Sek.), weiß mit dunkelpfirfichcarmin und liricoraunem Centrum: freie Saltung (4) . . . . . 10 Beiße Rofe (Sck.), rein weiß; Zellenrofenform (4) . . . 15

Eignen fich besonders gur Topffultur und fur fleine Sausgarten.

Quodezchen (Sek.), fcmarzbraun mit purpur-carmoifin (Lifi-

#### Die älteren Sorten liefern wir:

12 St. in 12 Sort. u. Wahl für 1 Ehlr. 10 Sgr. 25 " " 25" 100 " unserer Wahl für . " 2 " 15 " " Liliputen (Bouquet-Georginen).

12 " in 12 Sort. u. Wahl für 1 " 25 " " 25 " Wahl für . " 10 " " 100 " unferer Wahl für . " 10 "

find born als By 99 BB BA Ach Ach Ach Can Central Cold Cor Cort	Fuchstett,  redifiert,  redifiere Collection vereinigen Alles, was man von guten Guchsten angt.  16 Gorten, jede — Leit. 5 Spr.  12 Ct. mit Ramen für 1 Lit. — Sgr.  12 Ct. mit Ramen für 1 Lit. — Sgr.  25 " " " " 25 "  25 " " " " 3 " — "  Pelargonient.  Großblumige (Englische und Odier'sche).  Die Beschreibung und Aufzähung der einzelnen Barietäten unseres eitments siede Pflangen Catalog.  mglische, neue à St. 5 Spr.  neueste " 10 "  ranzösische Allegen Cobier) ältere " 10 "  neuere " 75 "  neueste " 10 "  neuere " 75 "  sestreiste Obiers altere " 5 "  indematum Pelarg, ältere " 5 "  neue " 75 "  pelargonium zonale et inquinance.  Sind in neuerer 3est ungemein vervollsommnet worden; die Karben viel reicher und manntafattiger als früher, die Blütbenstände bäusig der Wöße einer Dotrelienblume. Reine andere Binne tann biese Gruppen-Glorbune ersehen.  eaton-Hybriden à St. 7½ Sgr.  eaton-Hybriden à St. 7½ Sgr.  der intriberer Jahre 12 St. in 12 Sort. 1 Lit. 75 "  des schillstlichende: Auguste Ferrier 7½ Sgr. — Gloire de Nancy 1867er Reunbeit) 20 Sgr.  Mustwahl von Getwächsen, westen scholen in Reunschlissen plenissima 7½ Sgr. — Surpasse Gloire de Nancy (1867er Reunbeit) 20 Sgr.  Mustwahl von Getwächsen, " 20 "  Mustwahl von Getwächsen,	Crocosmea (Tritonia) aurea 12 St. 24 Sgt. Std. 3 Spahila imperialis Datura arborea (Brugmansin) 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	Winian Qua	Hengewächse.	
	Anemone coronaria.	Hengewunge.	ū

sor di	em Einpflanzen	me	rde	n d	otef	elt	en	erf	t 24	Zoll ti Stund	er gei	Wa	ffer
quell										100 TH	Stck. Sgr	St Sgr	ück Hg
ifter !	Rommel, gefüllt			-		101	.(0	ami	07000	1	15	113-21	9
11	" jcharlach .					100			. 68	1	15		9
11	einfach		180	n lu	٠,	420	1		. 00	1	95		9
	quelli	quellt.	quellt. Warman anfänt	quellt. 103 I my 140-22 m	quellt. 1882 I mig 1812-20 1819	quellt. Wa I mig lebez in 1903	quellt. 102 I am Ideal a 100 S an	quellt. 182 1 mg 191.22 a 179.8 u 19	quellt. 103 1 and 10 an	quellt. 102 1 mg 10022 m 170 2 m 12 2 m	quellt.	quellt. 1008tck. M 5gc	100 Stch.   St.   Su.   Sgr.   Sgr.

	Th	Sgr	Sgr	9
Admiral Zoutman, blau	2		1	
Agnarius, weiß, groß, gefüllt	1	15		
Azur incomparable, dunfeiblau, gefüllt	2	20	1	
Feu superbe, scharlach, gefüllt	1	20	100	
Feu incomparable, fcharlach und weiß, gefüllt	1	25	1	
L'Eclair, icarlach, groß, gefüllt, prachtvoll	2	15	1	Н
Couleur de sang, roth, neu, gefüllt	2	25	druge	ce!
Lord High Admiral, scharlach, neu, gefüllt	2	10 25	1	10
Rose surpassante, bunt, gefüllt ,	1	20	1	di
Anemone appenina	11 4	20	1	

100 Std. | Stad |

	SH	Sax.	Sac	The	100 Sta.   Staak
Anemone Nemorosa fl. pl.  " fl. roseo pl.  " Hepatica fl. albo  " fl. rubro pl.  " fl. rubro pl.  " fl. coeruleo pl. 12 ©t. 5½ £bir.	2 2 13 13 11	20 20 7½ 7½ 7½	1 1 4 4 3 14	3 3 6 6 9	Soucis doré   Set   Se
Ranunkeln, gefüllte.		CE.			Ranunculus asiaticus superbissimus, practi-
gehandlung im freien Lanbe wie bei den Anemonen. Darmoisi superde, tarmoifin Dedalis, farmoifin Janalière, dunfelroth Königin der Riederlande, schwarz gereurius, weiß, groß kigritienne, ichwarz, ertra Dphir, gelb und ichwarz gestect Drange brillant, gelb und schwarz  Türkische	2 2 2 2 3 2 2 2	15 15 10 10 10 10	1 1 1 1 1 1 1	3	voll; Beschreibung siehe Seite 18 dieses Kata- logs 25 St. 1 Thir. 15 Sgr., à St. 2½ Sgr.  Cyclamen Atkinsii (ibericum) album
Arrituje  Jarnin Turban  Jercules, weiß  Jerveilleuse, gelb  Jomano, jcharlach	2 2	10 7½ 25 20	1 1	6 6	Neapolitanum   26   26   7   7   7   7   7   7   7   7   7

Den Auszug aus unferem Pflangen: und Baumichulen Catalog weiter auszudehnen, geftattet uns hier der Naum nicht, übersenden auf Bunich wir gern bas genannte, 84 Geiten umfaffende, die meiften Pflangen beschreibende und mit raftifchen Bemerfungen verfehene Bergeichnif.

#### Grasfamen für Gärten.

	Dit.	Sgr.	Sgr	Phy		100	Pid. Sgr	Sgr	
igrostis capillaris (vulgaris) Majenftraußgraß, fetnes stolonifera (alba) Sioringraß inthoxanthum odoratum, Ruchgraß		9 . 9 15 18 15	3 3 7	6	Lolium perenne, englisches Naigras, importirt sein " " bier gebaut " " tenue, Pacey's e. K., extrasein " " " tenue, Pacey's e. K., extrasein " aristatum (italicum) italienisches Naigras,	6 9	15 :	2 2 3	6 6
vena elatior, franzölische Raigras ynosurus crystatus. Kammgras actylis glomerata, Knaulgras estuca heterophylla, verichiedensi. Schwingel ovina, Schafe-Schwingel pratensis, Wiesen-Schwingel olium perenne, englische Raigras, importirt, hochsein .	13 25 22 20 9 18		5 9 8 7 4 7	6	mbortirt phier gebaut Phleum pratense, Limothee, hochfein fein Poa pratensis, Wielenrisbengras	8 8 12 11 27 24 28 40	15	3 3 4 4 9 8 10 14	6 6 6

#### Bast in vorzüglicher Qualität à Pfund 8 Sgr.

sartenmeffer mit gebogener Rlinge, in verschiebener Größe und Qualität, bas Stud 1614, 2014, 21, 2414, 25 Sgr.; eins tacher, 141/4, 151/2 Sgt.; geringe Qualität, 11 Sgr.; elegne, heft nach ber inneren Sand geformt, jehr bequem, 1 Apit. 14 Sgr.; Gartenmeffer mit langem heft, der hintere Thoil bes-Heft nach ber inneren Hand gesormt, sehr bequem, 1 Ahr.

1 Sgr.; Gartenmeser mit langem heft, ber bintere Theil desselben dient beim Bersehen, wie auch aum Aussockern der Erde bei
Lophyslangen, 26<sup>2</sup>/<sub>8</sub> Sgr.; Gartenmesser, mit Täge, 27 Sgr.;
Gartenmesser, enthält: große Klinge, Säge, Gartenmesser, Dr.;
kumesser und Kortzieber, 1 Lyhr. 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr.

dulirmesser, 12<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Sgr., mit Reussiber-Beschlag, 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub>; englis
iche Form, 13<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Sgr., dieselbe in Elsenbein, 1 Lyhr.

dulirmesser mit Piropse oder Veredelungsmesser, 16<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Sgr.;
mit Reussiber-Beschlungsmesser, 12<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Sgr. 44 Sgr.; belaische

biropfe oder Beredelungsmeffer, 123/4 Sgr., 14 Sgr.; belgische Form, 153/4 Sgr., dieselbe in Elsenbein, 1 Lht. 13/2 Sgr., nach Tebenstein 18 Sgr.

Tiebenfreund 18 Sgr. traubenschere, 201/2 Sgr., 241/2 Sgr., 27 Sgr., 1 Thir. 61/4 Sgr., 1 Thir. 141/2 Sgr., 1 Thir. 181/2 Sgr., 27 Sgr., 1 Thir. 61/4 Sgr., 1 Thir. 141/2 Sgr., 1 Thir. 181/2 Sgr., 1 Thir. 26 Sgr. 1 Thir. 26 Sgr., besser 27 Schr. 27/2 Sgr., 28 Sgr.,

formtem Griff, 263/4 Ggr. Gage jum Bumachen, in ber

Taiche ju tragen, frangofiche Form, 183/4 Ggr. Baumfage mit Bogen. Sobenbeimer, 241/2 Ggr. gum Dreben bes Blattes, 1 Ehir. 15 Ggr.

Stattes, 1 2017. 13 Sogr. Oppfelbrecher, febr praktisch, 28 Sgr., amerikanischer ohne Zahne, 14 Sgr. Pirnenbrecher, sebr elegant, 3 Hr. 12 Sgr., dade und gabelsormige Haue, 16'/2 Sgr., Karschacke zum Reinigen und Lodern bes Bobens bienend, 28 Sgr., am Reinigen und Lodern bes Bobens bienend, 28 Sgr., Gabel zum Auskrauten (Ausgaten), 1934 Sqr.

Bflangentelle gum Berfegen ber Samlinge, 14 Ggr

Spagierftod mit Beil und Sammer ober mit Beil und Sade. 2 8 bir

Frascheere, um ben Rafen icon gleich zu schneiben, wie solches in England üblich, 4 Thir. 20 Sgr., etwas anders geformt um die Kansten zu ichneiben, 3 Thir. 16 Sgr.
Thermometer, jogenannter Cylinder, 121/2 Sgr.
auf holz mit Augelbebedung, 20 Sgr.
Dr. Gräfs unauslöschliche Etiquetten: Dinte à Flasche nebst

Gebrauchsanweisung, 10 Sgr. Kaltflüffiges Baumwachs nach Borfcrift bes Dr. Lucas, 1 Bfb. in Blechbuchfe, 16 Sgr.; 1/2 Kjund in Blechbuchfe, 12 Sgr. Keimplatten, die Keimfraft der Samen zu erproben, nebst Ge-

brauchsanweifung: à Stud 5 Ggr.

#### Nummerhölzer, Blumenftahe.

COX C. "X.	Länge Buß:	1	11/2	2	21/2	3	31/2	4	41/2	5
Blumenstäbe	pr. Scht. Sgr.	21/2	3	31/2	41/2	5	7.	8	12	14
Nummerhölzer	Länge Boll:	41/2	6	7	9	12	18			
	pr. Schf. Sgr.	11/4	2	21/2	3	51/2	10			

## Etablissements für Landwirthschaft, Forstwirthschaft u. Gartenbau



### **European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)